



HBSC

*Stili di vita e salute
dei giovani italiani
tra 11 e 15 anni*

Regione Piemonte



<i>PREFAZIONE</i>	6
<i>PREMESSA</i>	8
<i>RINGRAZIAMENTI</i>	9
1. LO STUDIO HBSC ITALIA 2018 E IL CAMPIONE REGIONALE	10
INTRODUZIONE	11
METODOLOGIA.....	11
POPOLAZIONE IN STUDIO	11
MODALITA' DI CAMPIONAMENTO	11
QUESTIONARI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E PROCEDURE DI ANALISI	12
VALUTAZIONE DEL COMITATO ETICO DELL'ISS E PRIVACY.....	12
DESCRIZIONE DEL CAMPIONE REGIONALE	13
2. IL CONTESTO FAMILIARE	15
LA FAMIGLIA.....	16
INTRODUZIONE	16
LA STRUTTURA FAMILIARE	16
LA QUALITA' DELLE RELAZIONI CON I GENITORI	18
LO STATUS SOCIO-ECONOMICO FAMILIARE.....	19
CONCLUSIONI.....	21
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	23
3. L'AMBIENTE SCOLASTICO	24
INTRODUZIONE	25
STRUTTURA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE INTERNA E PROMOZIONE DEL BENESSERE	25
RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI.....	30
RAPPORTO CON I COMPAGNI DI CLASSE	32
BULLISMO E CYBERBULLISMO.....	34
LA SCUOLA	38
CONCLUSIONI.....	39
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	40
4. SPORT E TEMPO LIBERO	42
INTRODUZIONE	43
L'ATTIVITA' FISICA.....	43
COMPORAMENTI SEDENTARI.....	46
FREQUENZA DELL'USO DI TELEVISIONE, COMPUTER E NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE.....	46
CONCLUSIONI.....	50
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	51
5. ABITUDINI ALIMENTARI E STATO NUTRIZIONALE	53
INTRODUZIONE	54
FREQUENZA E REGOLARITA' DEI PASTI	55
CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA.....	57
CONSUMO DI DOLCI E BEVANDE GASSATE	59
STATO NUTRIZIONALE	61

INSODDISFAZIONE CORPOREA.....	62
IGIENE ORALE.....	65
CONCLUSIONI.....	65
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	67
6. <i>COMPORAMENTI DI DIPENDENZA</i>	69
INTRODUZIONE	70
USO DI SOSTANZE.....	70
FUMO	71
ALCOL	72
CANNABIS	76
GIOCO D’AZZARDO	77
CONCLUSIONI.....	79
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	80
7. <i>SALUTE E BENESSERE</i>	82
INTRODUZIONE	83
SALUTE PERCEPITA.....	84
BENESSERE PERCEPITO.....	85
SINTOMI RIPORTATI.....	86
UTILIZZO DI FARMACI.....	89
ABITUDINI SESSUALI.....	89
INFORTUNI	90
RAPPORTO TRA PARI.....	91
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	93
8. <i>I SOCIAL MEDIA</i>	94
INTRODUZIONE	95
L’USO DEI SOCIAL MEDIA.....	95
CONCLUSIONI.....	97
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE.....	98

Il Gruppo di Ricerca HBSC Italia 2018

Istituto Superiore di Sanità: Paola Nardone, Angela Spinelli, Serena Donati, Daniela Pierannunzio, Enrica Pizzi, Silvia Andreozzi, Mauro Bucciarelli, Barbara De Mei, Chiara Cattaneo

Università degli studi di Torino: Franco Cavallo, Nazario Cappello, Giulia Piraccini, Paola Berchiolla, Alberto Borraccino, Lorena Charrier, Paola Dalmasso, Patrizia Lemma, Veronica Sciannameo

Università degli studi di Padova: Alessio Vieno, Natale Canale, Marta Gaboardi, Michela Lenzi, Claudia Marino, Massimo Santinello

Università degli studi di Siena: Giacomo Lazzeri, Mariano Vincenzo Giacchi, Andrea Pammolli, Rita Simi

Ministero della Salute: Daniela Galeone, Maria Teresa Menzano

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Alessandro Vienna

Referenti regionali: Claudia Colleluori, Manuela Di Giacomo, Ercole Ranalli (Regione Abruzzo), Gabriella Cauzillo, Mariangela Mininni, Gerardina Sorrentino (Regione Basilicata), Caterina Azzarito, Antonella Cernuzio, Marina La Rocca, Adalgisa Pugliese (Regione Calabria), Gianfranco Mazzarella (Regione Campania), Paola Angelini e Marina Fridel (Regione Emilia Romagna), Claudia Carletti, Federica Concina, Luca Ronfani, Paola Pani (Regione Friuli Venezia Giulia), Giulia Cairella, Laura Bosca, Maria Teresa Pancallo (Regione Lazio), Giannaelisa Ferrando (Regione Liguria), Corrado Celata, Liliana Coppola, Claudia Lobascio, Giuseppina Gelmi, Lucia Crottogini, Veronica Velasco (Regione Lombardia), Simona De Introna, Giordano Giostra (Regione Marche), Maria Letizia Ciallella, Michele Colitti, Ermanno Paolitto (Regione Molise), Marcello Caputo (Regione Piemonte), Domenico Stingi, Pina Pacella, Pietro Pasquale (Regione Puglia), Maria Antonietta Palmas, Alessandra Murgia (Regione Sardegna), Achille Cernigliaro, Maria Paola Ferro, Salvatore Scondotto (Regione Sicilia), Laura Aramini, Valentina Corridori, Giacomo Lazzeri (Regione Toscana), Marco Cristofori, Daniela Sorbelli, Giovanni Giovannini (Regione Umbria), Anna Maria Covarino (Regione Valle D'Aosta), Federica Michieletto, Erica Bino (Regione Veneto), Maria Grazia Zuccali (Provincia Autonoma di Trento), Antonio Fanolla, Sabine Weiss (Provincia Autonoma di Bolzano).

Il Gruppo di Ricerca Regionale HBSC 2018

Regione Piemonte

Marcello Caputo (referente regionale)
 Giafranco Corgiat Loia (Dirigente settore regionale)
 Monica Bonifetto, Silvia Cardetti, Paolo Ferrari (collaboratori)

Ufficio Scolastico Regionale

Paola Damiani / Daniela Pinna (referenti), Leonardo Filippone (Dirigente Ufficio IV)

Referenti e Operatori ASL

ASL AL: Tocci Simonetta (referente), Santolli Stefania, Iseppi Regina
 ASL AT: Renza Berruti (referente), Maria Petralia, Vincenzo Soardo, Cristian Valle.
 ASL BI: Michelangelo Valenti (referente), Andrea Rosazza, Chiara Torelli.
 ASL CN1: Pietro Luigi Devalle (referente), Mariangela Barale, Mario Bonanno, Silvia Cardetti, Alessandra Russo, Maria Elena Sacchi, Paola Rapalino.
 ASL CN2: Mauro Zarri (referente), Pietro Maimone.
 ASL NO: Flavia Milan (referente), Patrizia Grossi.
 ASL CITTA' DI TORINO: Filippo De Naro Papa (referente), Daniela Agagliati, Marina Spanu.
 ASL TO3: Teresa Denise Spagnoli (referente), Debora Lo Bartolo.
 ASL TO4: Giuseppe Barone (referente), Manuela Sciancalepore, Simone Depau, Sara Richeda.
 ASL TO5: Margherita Gulino (referente), Angela Dimartino, Monica Minutolo, Anna Aldrighetti, Ilaria De Luca, Anna Costa, Marina Mortara, Lucia Albano.
 ASL VC: Gianfranco Abelli (referente), Maria Luisa Berti, Luisa Novella.
 ASL VCO: Sara Rita Licciardello (referente)

Responsabilità editoriali

Il Gruppo di coordinamento nazionale HBSC e il gruppo di coordinamento scientifico del progetto sono responsabili:

- di tutte le parti comuni dei report regionali, incluse le introduzioni ai vari capitoli, se non modificate dai responsabili regionali;
- dei dati contenuti nelle tabelle e dei grafici allegati.

I gruppi regionali sono responsabili di tutte le parti scritte a commento dei dati a loro forniti e delle parti introduttive, se modificate rispetto a quanto fornito dal gruppo nazionale.

PREFAZIONE

L'adolescenza rappresenta un momento importante per il passaggio alla vita adulta ed è caratterizzata da numerosi cambiamenti fisici, psicologici relazionali e sociali. Proprio in questo periodo possono instaurarsi stili di vita e comportamenti che condizionano la salute presente e futura come abitudini alimentari scorrette, sedentarietà, abuso di alcol, consumo di tabacco, uso di sostanze stupefacenti.

Lo studio HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) si inserisce in questo contesto con lo scopo di fotografare e monitorare la salute degli adolescenti italiani di 11, 13 e 15 anni e costituire un supporto per l'orientamento delle politiche di educazione e promozione della salute in questa fascia di età.

HBSC è uno studio multicentrico internazionale svolto in collaborazione con l'Ufficio Regionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Europa e prevede indagini campionarie su scala nazionale ogni 4 anni.

Lo studio è stato promosso da Inghilterra, Finlandia e Norvegia nel 1982 e oggi il Network HBSC comprende 49 paesi in Europa, Nord America e Israele e un vasto team multidisciplinare di studiosi e ricercatori.

L'Italia è entrata a far parte di questo Network nel 2000 e dal 2002 ad oggi sono state realizzate cinque raccolte dati (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018) promosse e finanziate dal Ministero della Salute/CCM, coordinate dalle Università di Torino, Padova e Siena e svolte in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e le Regioni.

Fino al 2006 lo studio HBSC è stato condotto solo a livello nazionale da un team di tre Università (Torino, Siena e Padova) con il coordinamento dell'Università di Torino. L'indagine si è estesa progressivamente anche a livello regionale coinvolgendo Piemonte, Veneto, Toscana, Lombardia e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Nel 2010 HBSC è entrato a far parte del progetto "Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni", coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e promosso dal Ministero della Salute/CCM, in collaborazione con il MIUR e collegato alla strategia europea "Gaining health". In questa edizione, l'indagine HBSC ha previsto per la prima volta una rappresentatività sia nazionale che regionale, permettendo di avere dati rappresentativi della realtà territoriale a livello di tutte le regioni.

Nel 2017, Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm), "Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, in attuazione del Decreto legge n. 179 del 2012" - GU Serie Generale n.109 del 12-5-2017 ha inserito il "Sistema di sorveglianza sui rischi comportamentali in età 11-17 anni" tra quelli di rilevanza nazionale e regionale e ha individuato nell'ISS l'Ente presso il quale è istituito. L'ISS ha coordinato la rilevazione del 2018 con la collaborazione dell'Università di Torino, di Siena e di Padova, storicamente coinvolte nello studio nazionale e internazionale.

Ogni capitolo di questo rapporto presenta e analizza i dati regionali relativi all'ambito studiato tra cui il contesto familiare e scolastico, le abitudini alimentari e i comportamenti a rischio, cercando di delineare un quadro puntuale della situazione nel territorio in osservazione.

Il nostro augurio è che questa attività di monitoraggio, proseguendo nel tempo, permetta di verificare i mutamenti, positivi o negativi, dei fenomeni osservati in rapporto alle politiche di intervento messe in atto.

Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno reso possibile la buona riuscita dell'indagine: i referenti di ciascuna regione, gli operatori sanitari, i dirigenti scolastici e gli insegnanti di tutti gli istituti coinvolti. Un ringraziamento particolare va ai ragazzi che, con la loro preziosa collaborazione nel compilare i questionari, hanno reso tutto questo possibile.

Il gruppo di ricerca HBSC Italia 2018

PREMESSA

L'indagine HBSC è un'indagine internazionale, svolta in collaborazione con l'OMS Europa in 50 paesi tra Europa e Nord America. In Italia si è progressivamente affermata come lo strumento di sorveglianza dei comportamenti nell'età pre-adolescenziale e adolescenziale e rimane fondamentale per la possibilità di accrescere la conoscenza dei determinanti di salute e del benessere degli adolescenti al fine di poter meglio orientare le politiche (regionali, nazionali e internazionali) di prevenzione e promozione della salute rivolte ai giovani.

Questa indagine integra e completa le altre sorveglianze di popolazione nazionali e regionali: "Sorveglianza 0-2" (prima infanzia), "Okkio alla Salute" (scuola primaria), PASSI e PASSI D'ARGENTO (popolazione adulta e anziana). L'insieme di queste attività di sorveglianza periodica sono risultate fondamentali in questi anni per la definizione dei bisogni di salute e per la programmazione di attività di prevenzione e promozione della salute nella popolazione. Sono inoltre diventate un riconosciuto strumento di riferimento per il monitoraggio delle attività e dei risultati dei Piani Nazionale e Regionali di Prevenzione. L'attuazione delle sorveglianze, grazie agli operatori delle ASL, contribuisce allo sviluppo di una rete di epidemiologia diffusa, un patrimonio comune di tutti gli operatori e servizi del sistema sanitario piemontese, per far sì che le attività di pianificazione e valutazione siano fondate sulle evidenze epidemiologiche.

Il report che viene presentato si riferisce all'indagine attuata nel 2018, la quarta in Piemonte, dopo quelle svolte nel 2004, nel 2008 e nel 2014. Anche questa edizione è stata caratterizzata da un'ottima adesione, pari al 99% delle 168 classi campionate, segno dell'impegno degli operatori sanitari delle ASL, ma anche della consolidata collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, gli Uffici Scolastici Provinciali e le Scuole del territorio, da sempre strategica e indispensabile nella realizzazione delle raccolte dati in ambito scolastico.

I ragazzi coinvolti nell'indagine 2018 sono stati 3.022, rappresentativi delle classi di età 11-13 anni e 15 anni. Le informazioni presenti in questo report sono tante e ci consentono di avere un quadro aggiornato dei principali fattori comportamentali che possono promuovere o compromettere la salute attuale e futura degli adolescenti. Poiché, com'è noto, molti comportamenti nell'età adulta si strutturano in questa età, è necessario definire e consolidare programmi e politiche efficaci per favorire, fin dall'adolescenza, comportamenti positivi per la salute. I dati forniti da HBSC saranno molto utili per la definizione del profilo di salute della popolazione adolescenziale del Piemonte e per l'individuazione delle priorità su cui intervenire con la nuova programmazione del Piano Regionale della prevenzione 2021-2025.

Un ringraziamento va a tutti gli operatori delle ASL e delle scuole piemontesi che hanno contribuito alla realizzazione dell'indagine attraverso la somministrazione dei questionari e il caricamento dei dati.

Bartolomeo Griglio
Responsabile del Settore "Prevenzione e
Veterinaria" – Direzione Sanità e Welfare
Regione Piemonte

RINGRAZIAMENTI

Si ringraziano tutti gli studenti che hanno compilato i questionari.

Si ringraziano i Docenti e i Dirigenti scolastici che hanno contribuito alla realizzazione dello studio.

Si ringraziano tutte le scuole della Regione Piemonte, di seguito riportate, che hanno partecipato allo studio HBSC Italia 2018.

Scuole secondarie di secondo grado

IT Settore Economico Ieri Montalcini, Acqui Terme; Istituto Leonardo da Vinci, Alessandria; Istituto Alessandro Volta, Alessandria; Istituto Guglielmo Marconi, Tortona; Istituto Professionale S. Ronco, Trino Vercelli; Istituto F Vercelli, Asti; Istituto Gauss Asti; Liceo scientifico Avogadro, Biella; I.P. Zegna Biella; Liceo Ancina Fossano; IIS Vasco Beccaria Govone Mondovì, Istituto Cigna Garelli Mondovì; ITIS Del Pozzo Cuneo; Istituto Da Vinci Alba; IIS Cillario Ferrero, Neive; Istituto A. Antonelli, Novara; Istituto Carlo Alberto, Novara; Istituto T. Bellini Novara; ITC Quintino Sella, Novara; Istituto Galilei Borgo Manero; ITE Pascal, Romentino; Liceo Classico Musicale Cavour, Torino; IIS Regina Margherita, Torino; IIS G. Ferraris, Torino; Liceo Scientifico Primo Levi, Torino; Liceo scientifico C.Cattaneo, Torino; IIS Giordano Bruno, Torino; Liceo Scientifico Gobetti, Torino; IPS Beccari, Torino; IP Giolitti, Torino; Istituto Bodoni-Paravia, Torino; ITSSE Carlo Levi, Torino; Istituto Russel – Moro, Torino; Istituto C. Grassi, Torino; IIS G.F. Porporato, Pinerolo; Liceo M, Curie, Grugliasco; Istituto E. Majorana, Grugliasco; Istituto C. Darwin, Rivoli; Istituto A.Prevert, Osasco; istituto F. Albert, Lanzo Torinese; istituto T. Martinetti, Caluso; Istituto T. D’Oria, Ciriè; IIS Fermi Galilei, Ciriè; Istituto G Ferraris, Settimo Torinese; Istituto XXV Aprile, Cuorgnè; Istituto G. Cena, Ivrea; Liceo Scientifico Bobbio, Carignano; Istituto A. Monti, Chieri; Istituto Ferrari, Borgo Sesia, Istituto G Pastore, Varallo Sesia, IPSSAR Soldati, Gattinara; ITC Cavour, Vercelli; Liceo Cobianchi, Verbania; IPSCT Franzosini, Verbania; Liceo Scientifico Spezia, Domodossola; IT G. Marconi, Domodossola; IPSIA Dalla Chiesa, Omegna.

Scuole secondarie di primo grado

G Pascoli, Valenza; G. Saracco, Bistagno; P Straneo, Alessandria; Dante Alighieri, Pozzolo Formigaro; Monteverde, Acquiterme; Ferrari, Trino Vercellese; Scuola Media Gorla, Villafranca d’Asti; Gancia, Canelli; Scuola media Addis Abeba 37, Biella; Rosabianca Saluzzo; Scuola Media Valdieri; Scuola Media Vicoforte; scuola media Bagnasco; Scuola Media Borgo San Giuseppe Cuneo; Scuola media Madonna dell’Olmo; Papa Giovanni XXIII Savigliano; Scuola Media Marene; Scuola Media Corso Soleri, Cuneo; Piumati Craveri Dalla Chiesa, Bra; Scuola Media Somamriva Perno; Scuola Media Pocapaglia; Scuola Media Sibona Canale; T.L. Dalmasso, Govone; O.F. Mossotti, Carpignano Sesia, Tadini, Cameri; Scuola Media Fontaneto d’Agogna; Belfanti, Castelletto Ticino; Pier Lombardo, Novara; Don Bosco, Torino; Perotti, Torino; Umberto I, Torino; Foscolo, Torino; Bobbio, Torino; C Alvaro- A Modigliani, Torino; IC Da Vinci, Torino; IC Turollo, Torino; IC Tommaseo Calvino, Torino; IC Alberti, Torino; IC Torino Secondo – Morelli, Torino; Aldo Moro, Bruiono; Primo Levi, Rivoli; IC Susa-Giuliano; Susa; IC Bussoleno - Fermi, Bussoleno; IC Venaria 1- Lessona, Venaria Reale; IC venaria 2- Don Milani, Venaria; IC Nichelino 1 Manzoni, Nichelino; IC Buttigliera – Rosta, Rosta; IC Pinerolo 3- Piscina, Piscina; IC Valperga – Arnulfi, Valperga; IC Montanaro Foglizzo, Foglizzo; IC Moncalieri SM Clotilde, Moncalieri; IC Azeglio- Vestignè- Torazzi, Vestignè; IC Rivarolo-Gozzano, Rivarolo Canavese; IC Pavone-via vlgiale, Pavone Canavese; IC Pavone- Banchette - Pertini; Banchette; IC Volpiano- Alighieri, Volpiano; IC Cambiano-Lagrange, Cambiano; IC Vinovo- Gioanetti, Vinovo; IC Nichelino 1- Manzoni, Nichelino; IC Nichelino 2- Pellico, Nichelino; IC Nichelino 3- Martiri Resistenza, Nichelino; Scuola Media Ferrari, Vercelli; Scuola Media Borgo Sesia.

1. LO STUDIO HBSC ITALIA 2018 E IL CAMPIONE REGIONALE

INTRODUZIONE

*“For a safer and more secure future,
we must pay much more urgent attention to the hopes
and needs of young people
and adolescents”*

[Kleinert S. et al.; Lancet. 2016¹]

L'adolescenza rappresenta un periodo di grandi cambiamenti e sfide che richiede un'attenzione particolare in quanto in questa fase di vita, comunemente definita di transizione, si consolidano comportamenti che possono persistere in età adulta e compromettere o garantire lo stato di salute delle generazioni future. Investire nella salute dei giovani oggi, rappresenta dunque un guadagno in salute domani.

Proprio in quest'ottica si inserisce l'HBSC (Health Behaviour in School-aged Children - Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare) con lo scopo di descrivere e comprendere fenomeni e comportamenti correlati con la salute nella popolazione pre-adolescente e adolescente.

La rigidità del protocollo di indagine, cui tutti i Paesi partecipanti al network HBSC devono attenersi, consente la confrontabilità dei dati raccolti a livello internazionale e nazionale e garantisce la costruzione di indicatori di salute solidi utili anche per monitorare l'efficacia di eventuali azioni e interventi di promozione della salute intrapresi.

In questo capitolo è descritta la popolazione in studio e in dettaglio la procedura di campionamento che ha coinvolto tutte le regioni italiane.

METODOLOGIA

POPOLAZIONE IN STUDIO

La popolazione in studio è costituita dai ragazzi di 11, 13 e 15 anni che frequentano rispettivamente le prime e le terze classi delle scuole secondarie di I grado e le classi seconde delle scuole secondarie di II grado (sia scuole statali sia paritarie distribuite in tutte le regioni italiane). Le scuole di fatto sono il setting ideale per la raccolta dei dati sia in termini operativi che in vista di possibili interventi di comunità.

MODALITA' DI CAMPIONAMENTO

La procedura di campionamento ha seguito le linee guida tracciate a livello internazionale. La stratificazione è stata fatta su base territoriale assumendo come strati le regioni. Per la selezione dei soggetti è stato utilizzato un campionamento a grappolo (cluster) in cui l'unità di campionamento primaria è costituita dalla classe scolastica, selezionata secondo un campionamento sistematico dalla lista completa delle scuole, pubbliche e paritarie, fornita dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR).

La numerosità campionaria è di 1.200 soggetti per fascia di età; tale numerosità è stata maggiorata del 5% per la fascia di età dei 13enni e del 15% per la fascia di età dei 15enni al fine di considerare la presenza in queste fasce di età di eventuali alunni ripetenti. Le numerosità ottenute sono state poi maggiorate del 10% in tutte le fasce di

età per considerare i tassi di non-rispondenza attesa degli alunni in base alle rilevazioni precedenti al fine di raggiungere una precisione della stima, valutata sulla frequenza attesa dello 0,5 per una variabile binomiale, del 3,5% con I.C. del 95%. E' stato inoltre introdotto, per le regioni che ne hanno fatto richiesta, un sovracampionamento.

QUESTIONARI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI E PROCEDURE DI ANALISI

Le informazioni sono state raccolte attraverso due questionari: uno per i ragazzi e uno per il dirigente scolastico (quest'ultimo opzionale). Entrambi i questionari sono stati elaborati da un gruppo di ricerca multidisciplinare e internazionale; contengono una parte "core" comune a tutti i Paesi partecipanti e una parte "opzionale" con domande inserite su iniziativa del gruppo nazionale di coordinamento.

Il questionario rivolto ai ragazzi ha la finalità di indagare aspetti sulla salute nella sua accezione più ampia di benessere fisico, psicologico, relazionale e sociale e comprende le seguenti sezioni:

- dati anagrafici (età, sesso, Paese di nascita, ecc.);
- classe sociale (occupazione e livello di istruzione dei genitori);
- indicatori di benessere percepito (stato di salute e di benessere);
- autostima (valutazione del proprio aspetto fisico e del grado di accettazione di sé);
- rete di sostegno socio-affettivo (rapporto con i genitori, i coetanei, l'ambiente scolastico);
- comportamenti collegati alla salute (attività fisica e tempo libero, abitudini alimentari e igiene orale, abitudini sessuali, consumo di alcol e tabacco, gioco d'azzardo, consumo di cannabis, bullismo e cyberbullismo);
- uso di Internet e social network.

Le sezioni riguardanti il consumo di cannabis e le abitudini sessuali sono presenti solo nei questionari per i quindicenni.

Il questionario rivolto al dirigente scolastico, somministrato contestualmente alla raccolta dati rivolta ai ragazzi, indaga alcune dimensioni relative ad aspetti della scuola, nello specifico:

- caratteristiche strutturali e risorse della scuola;
- misure di promozione della salute adottate;
- informazioni sul quartiere in cui è situata la scuola.

Entrambi i questionari sono anonimi e vengono autocompilati dai ragazzi e dai dirigenti scolastici a scuola e con il sostegno degli insegnanti che hanno ricevuto informazioni opportune sulle procedure da seguire da parte del personale delle Asl.

Le risposte ai questionari vengono acquisite mediante la lettura ottica da parte di una ditta incaricata del lavoro a livello nazionale.

La costruzione del database, la pulizia dei record e la successiva analisi dei dati è stata realizzata a livello centrale dal gruppo di coordinamento dell'ISS e delle tre Università.

VALUTAZIONE DEL COMITATO ETICO DELL'ISS E PRIVACY

I genitori dei ragazzi delle classi campionate ricevono prima della rilevazione una nota informativa della regione con la descrizione delle finalità della Sorveglianza. Le famiglie possono rifiutare la partecipazione del proprio figlio attraverso l'informativa che deve essere comunque restituita, firmata dai genitori, agli insegnanti della classe coinvolta.

Non vengono rilevati dati identificativi dei singoli individui che partecipano all'indagine sia perché la sorveglianza è interessata a dati di popolazione sia per rispetto della normativa sulla privacy.

La versione definitiva del protocollo e dei questionari adottati nel 2018 sono stati presi in esame e valutati positivamente dal Comitato Etico dell'ISS nella seduta del 20 novembre 2017.

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE REGIONALE

Nella Regione Piemonte sono state campionate 120 classi per la scuola secondaria di I grado (Classe I media e III media) e 66 classi di per la scuola secondaria di II grado (Classe II superiore), per un totale di 186 classi. Considerando anche le eventuali classi di riserva utilizzate, hanno restituito i questionari compilati 185 classi con una rispondenza complessiva del 99,5% (tabella 1.1). La buona partecipazione delle classi campionate, oltre a garantire la rappresentatività del campione, conferma l'efficacia delle fasi preparatorie dell'indagine e la positiva sinergia tra il settore scolastico e quello della salute.

Tabella 1.1 Rispondenza per classe (%)

	Classi campionate	N° di classi che hanno compilato il questionario	Percentuale di rispondenza (%)
Classe I media	58	58	100,0
Classe III media	62	62	100,0
Classe II superiore	66	65	98,5
Totale	186	185	99,5


Il campione era costituito da un totale di 3022 studenti di cui: il 33% di 11 anni, il 35% di 13 anni ed il 32% di 15 anni (tabella 1.2).

Tabella 1.2 Composizione del campione, per età' e genere

	Maschi	Femmine
11 anni	52,2% 522	47,8% 478
13 anni	52,6% 560	47,4% 505
15 anni	54,2% 519	45,8% 438
Totale	52,8% 1601	47,2% 1421

Circa il 5% dei ragazzi risulta nato all'estero, con una maggiore prevalenza nella fascia d'età dei quindicenni (5,8%) (figura 1).

Figura 1. Composizione del campione per Paese di nascita - Italia vs Estero, per età (%)



Nella tabella seguente è riportata la descrizione del campione per luogo di nascita dei genitori.

TABELLA 1.3 COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE DEI GENITORI DEI RAGAZZI ED ETÀ' PER NASCITA IN ITALIA E ALL'ESTERO (%)

ENTRAMBI I GENITORI NATI IN ITALIA	84	%
ALMENO UN GENITORE NATO ALL'ESTERO	5	
ENTRAMBI I GENITORI NATI ALL'ESTERO	11	

Per la maggioranza degli adolescenti entrambi i genitori hanno nazionalità italiana, infatti solo nel 16% dei casi gli adolescenti dichiarano di avere un genitore o entrambi di altra nazionalità.

2. IL CONTESTO FAMILIARE

LA FAMIGLIA

INTRODUZIONE

L'adolescenza è un processo evolutivo che coinvolge non solo i ragazzi, ma l'intera famiglia.

Le trasformazioni che interessano i ragazzi sul piano psico-fisico si accompagnano anche a un cambiamento delle relazioni familiari e amicali^{1,2}.

La famiglia, insieme alla scuola e al mondo dei pari, è l'ambito nel quale gli adolescenti iniziano a costruire la propria identità personale e il proprio ruolo sociale. Attraverso la ridefinizione dei rapporti con i genitori e, contemporaneamente, ad un più intenso investimento nelle relazioni amicali, avviano una progressiva acquisizione di autonomia con precue componenti affettive, ideative e sociali³.

In questo capitolo si approfondisce il ruolo della struttura familiare e della relazione genitori-figli che, insieme al livello socio-economico della famiglia, definiscono il contesto di vita, e la percezione che i ragazzi hanno di essa, aspetti questi in grado di influenzare il benessere e i comportamenti di salute nel loro complesso.

LA STRUTTURA FAMILIARE

La struttura familiare negli ultimi anni, seguendo le trasformazioni della società, è diventata sempre più complessa e ha subito un processo di diversificazione. Anche se in Italia questo processo che ha visto crescere nuove strutture familiari è cominciato più tardi rispetto ad altri paesi europei, la cosiddetta famiglia tradizionale non è più la sola opzione. Infatti è ormai comune imbattersi in famiglie mono-genitoriali, o famiglie in cui i genitori abbiano divorziato e convivano con un altro partner o si siano in seguito risposati.

In termini di cambiamenti della struttura familiare si possono annoverare la diminuzione della numerosità dei componenti della famiglia, l'aumento delle famiglie monogenitoriali (single), la diminuzione delle famiglie allargate o estese (con nonni o altri parenti) che un tempo erano una risorsa mentre oggi nascono dalle necessità, spesso di salute, dei componenti più anziani e infine la crescita di nuove tipologie familiari: in particolare le famiglie mono-genitoriali e le famiglie ricostituite⁴.

Secondo i dati ISTAT (ISTAT, Popolazione e famiglie 2018⁵), circa il 16% delle famiglie italiane sono monogenitoriali. Anche in Italia, si è ormai compiuto il passaggio dalla vecchia monogenitorialità, originata dalla vedovanza, alla nuova monogenitorialità derivante dalla rottura volontaria dell'unione coniugale e dalle nascite al di fuori del matrimonio o da madri single.

La famiglia ricostituita invece è quel nucleo in cui almeno uno dei coniugi, con o senza figli, è al suo secondo matrimonio.

Questi cambiamenti, che si intrecciano con le relazioni interpersonali, hanno un forte impatto sullo sviluppo psico-fisico dei ragazzi sia nella fase dell'infanzia che in quella dell'adolescenza⁶. Studiare la famiglia nei suoi diversi aspetti, strutturali e relazionali, diventa quindi quanto mai attuale.

Numerosi studi sono stati condotti per valutare se i bambini che vivono con un solo genitore, o i cui genitori abbiano attraversato il divorzio ed eventualmente si siano risposati, presentino un diverso livello di benessere, rispetto a bambini provenienti da famiglie cosiddette tradizionali. La letteratura esistente ha già evidenziato come la struttura familiare sia correlata con il benessere psicologico dei genitori^{7,8} o come il

cambiamento della struttura familiare abbia delle conseguenze anche di tipo economico⁹.

Riguardo a questo ultimo punto, è stata osservata una forte associazione tra basso livello socio-economico e salute psichica dei bambini¹⁰, e come l'instabilità familiare in generale sia strettamente legata con lo sviluppo dei rapporti sociali dei ragazzi¹¹.

Diversi autori hanno però messo in discussione queste relazioni, sostenendo che lo svantaggio diventa reale soltanto quando a questa condizione se ne uniscono altre, come l'isolamento dal contesto sociale e dalle altre famiglie, oppure uno stato di conflittualità permanente o l'esistenza di problemi economici^{12,13}.

Non è tuttavia ancora chiaro se questo tipo di associazioni causali si riscontrino anche tra gli adolescenti.

Il presente studio indaga la struttura familiare chiedendo ai giovani di indicare con quali persone vivono per la maggior parte del tempo (genitori, genitori acquisiti, nonni, altri adulti, altro). Dalle risposte sono state ricavate le principali tipologie di struttura familiare (tabella 2.1): le coppie con figli rappresentano la tipologia quantitativamente più rilevante; le famiglie monogenitori rappresentano il 15% dei nuclei familiari di cui il 13% composti da donne. Nel 3% dei casi i ragazzi vivono all'interno di famiglie "ricostituite" che possono essere più o meno complesse e appaiono caratterizzate da una certa fragilità. Solo nell'1% dei casi i ragazzi hanno indicato di non vivere con i genitori ma in altra sistemazione senza genitori o nonni.

TABELLA 2.1 TIPOLOGIA DI FAMIGLIA (%)

	%
MADRE E PADRE (NO ALTRI ADULTI)	81
SOLO MADRE	13
SOLO PADRE	2
FAMIGLIA RICOSTITUITA (PADRE O MADRE BIOLOGICI PIÙ NUOVO CONIUGE)	3
ALTRA SISTEMAZIONE SENZA GENITORI O PARENTI/ NONNI	1
TOTALE	100

Come si evince dalla tabella 2.2, più della metà del campione (58%) ha un solo fratello o sorella, mentre solo 1 ragazzo su 4 ha 2 o più fratelli. I figli unici sono rappresentati dal 16% del campione.

TABELLA 2.2 FRATELLI E SORELLE (%)

	%
FIGLI UNICI	16
1 FRATELLO O SORELLA	58
2 O PIÙ FRATELLI O SORELLE	26
TOTALE	100

LA QUALITÀ DELLE RELAZIONI CON I GENITORI

La natura e la qualità delle relazioni che i ragazzi instaurano con i genitori, durante l'adolescenza, influiscono in misura rilevante sui loro comportamenti di salute e sul benessere percepito. Molti studi hanno dimostrato che la comunicazione familiare è un indicatore della capacità dei genitori di aiutare i loro figli adolescenti ad affrontare positivamente le difficoltà che possono incontrare^{14,15}, come la pressione scolastica, le relazioni con i pari, le aspettative e i cambiamenti psico-fisici.

È stato osservato che la qualità della relazione con i genitori è associata alla propensione ad adottare comportamenti di salute a rischio. Ad esempio avere una relazione difficile con la madre risulta associato ad una maggiore propensione all'abitudine al fumo e, al consumo frequente di alcol e di altre sostanze^{14,16}.

Una buona comunicazione con la figura paterna può avere un effetto positivo sul benessere percepito^{13,17}. In particolare, negli adolescenti con una comunicazione positiva con il padre si osserva una minore incidenza di sintomi depressivi,¹⁸ comportamenti antisociali^{19,20} e comportamenti di rischio per la salute^{21,22}, una migliore autostima²³ e meno problemi scolastici²². Nello studio HBSC, la comunicazione familiare è stata indagata chiedendo ai ragazzi di valutare la comunicazione relativa ad aspetti che li preoccupavano con le persone con cui vivono (madre, padre, patrigno o matrigna). Le modalità di risposta alla domanda "Quanto è facile per te parlare di cose che ti preoccupano veramente" sono distribuite su una scala di tipo ordinale da "molto facile" a "non ho o non vedo questa persona". Nelle tabelle 2.3 e 2.4 si possono osservare le risposte relative a ciò che i ragazzi riferiscono rispetto alla facilità di comunicare sia con il padre che con la madre.

TABELLA 2.3: "QUANTO È FACILE PER TE PARLARE CON TUO PADRE DI COSE CHE TI PREOCCUPANO VERAMENTE?", PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MOLTO FACILE	33,8	23,6	12,2
FACILE	37	32,8	37,2
DIFFICILE	17,1	24,5	30,7
MOLTO DIFFICILE	7,8	14,3	14,8
NON HO O NON VEDO MAI QUESTA PERSONA	4,3	4,8	5,1
TOTALE	100	100	100

TABELLA 2.4: QUANTO È FACILE PER TE PARLARE CON TUA MADRE DI COSE CHE TI PREOCCUPANO VERAMENTE?, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MOLTO FACILE	55,5	35,9	27,2
FACILE	31,8	37,1	44,7
DIFFICILE	8,5	18,9	17,8
MOLTO DIFFICILE	3,7	7,1	8,5
NON HO O NON VEDO MAI QUESTA PERSONA	0,5	1	1,7
TOTALE	100	100	100

Dal confronto fra le due tabelle (2.3 e 2.4) appare come sia più facile per i ragazzi parlare delle proprie preoccupazioni con la madre che con il padre, a tutte le età.

Se si prende in considerazione il rapporto genitori/figli rispetto al genere, si osservano differenze in tutte le età nella comunicazione con il padre e la madre (figura 2.1 e 2.2): fra coloro che dichiarano facile/molto facile parlare con i genitori, osserviamo che ciò avviene più frequentemente per i ragazzi rispetto alle ragazze, sia quando si tratta di parlare con il padre che con la madre.

Figura 2.1 Frequenza di coloro che dichiarano essere facile o molto facile parlare con il padre, per genere ed età (%)





Figura 2.2 Frequenza di coloro che dichiarano essere facile o molto facile parlare con la madre, per genere ed età (%)



LO STATUS SOCIO-ECONOMICO FAMILIARE

La condizione socio-economica familiare è un'altra dimensione che influenza fortemente la salute dei ragazzi²⁴. Numerosi studi hanno dimostrato che il livello socio-economico influenza positivamente la qualità delle relazioni con i genitori^{25,26} anche in

maniera indiretta. È stato infatti osservato che il livello socio-economico è un mediatore della relazione tra la struttura familiare e il benessere psicologico dei ragazzi^{12,27}.

Secondo la definizione adottata dal protocollo dello studio HBSC, lo status socio-economico è rappresentato da una misura composita che incorpora lo status economico (reddito), lo status sociale (educazione) e lo status professionale (occupazione) così come definito dai seguenti indicatori:

- status economico (reddito): il primo indicatore è relativo al livello dei consumi, che viene assunto come proxy per valutare il reddito (in quanto quest'ultimo è difficilmente conosciuto e definito dai ragazzi). Si cerca dunque di valutare il benessere economico oggettivo, o livello di agiatezza, attraverso la rilevazione della presenza di beni comuni con lo strumento della scala FAS (*Family Affluence Scale*, scala di agiatezza/ricchezza familiare)²⁸. Le risposte sono state sommate e i punteggi totali del FAS sono stati divisi in tre gruppi (basso, medio, alto);
- status sociale (istruzione): il secondo indicatore si riferisce al livello di istruzione dei genitori;
- status professionale (occupazionale): il terzo indicatore si riferisce all'occupazione dei genitori.

A questi indicatori, si aggiunge un quarto elemento di valutazione relativo alla percezione che i ragazzi hanno dello stato di benessere della propria famiglia; ai ragazzi viene infatti chiesto di indicare quanto pensino stia bene la propria famiglia dal punto di vista economico. Le modalità di risposta a questa domanda sono distribuite su una scala ordinale da "Molto bene" a "Per niente bene".

Nella tabella 2.5 è riportata la distribuzione delle famiglie secondo il livello socio-economico.

TABELLA 2.5 STATUS SOCIO-ECONOMICO MISURATO SECONDO LA FAMILY AFFLUENCE SCALE (DA 'BASSE POSSIBILITÀ DI CONSUMO' AD 'ALTE POSSIBILITÀ DI CONSUMO') (%)

FAMILY AFFLUENCE SCALE (FAS)	%
BASSO	24,8
MEDIO	48,4
ALTO	26,8
TOTALE	100

Circa metà delle famiglie (48%) si colloca nella fascia di "media possibilità di consumo"; l'altra metà si distribuisce per un quarto (24,8%) nella fascia "bassa possibilità di consumo" e per poco più di un quarto (26,8%) nella fascia "alta possibilità di consumo".

In tabella 2.6 è invece riportata la distribuzione del livello di istruzione dei genitori dichiarato dai ragazzi intervistati.

TABELLA 2.6 LIVELLO DI ISTRUZIONE DEL PADRE E DELLA MADRE DICHIARATO DAI RAGAZZI, PER ETÀ (%)

PADRE	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
LICENZA ELEMENTARE	1,3	1,2	1,9
LICENZA MEDIA	9,5	23,1	23,8
SCUOLA PROFESSIONALE	8	15,5	12,7
MATURITÀ	18,1	28,6	31,8
LAUREA	21,3	18,6	22,2
NON SO	41,7	13	7,6
MADRE			
LICENZA ELEMENTARE	1,0	1,1	1,4
LICENZA MEDIA	8,1	15,3	17,4
SCUOLA PROFESSIONALE	7,3	11,9	12,3
MATURITÀ	20,7	35,9	36,1
LAUREA	26,7	25,2	26,4
NON SO	36,2	10,6	6,3

Per quanto riguarda il livello d'istruzione dei genitori, si osserva la presenza di titoli di studio medio/alto (maturità-laurea) in quasi metà dei padri (46%) e in più di metà delle madri (56%); quasi un terzo dei padri (31%) e un quarto delle madri (24%) ha un titolo di studio inferiore alla licenza di maturità. Questi dati vanno letti tenendo conto della rilevante percentuale di risposte "non so" (23% per i padri e 20% per le madri).

CONCLUSIONI

La vita in famiglia è in grado di influenzare fortemente le modalità con cui i ragazzi si rapportano con il mondo e alcune condizioni, come la posizione sociale, influenzano la probabilità di essere esposto ai principali fattori di salute fisica e mentale (fattori di rischio dell'ambiente sociale e fisico, stili di vita, capacità di accesso alle cure): per questo motivo è interessante analizzare alcuni aspetti del contesto familiare: la struttura di convivenza, la qualità percepita delle relazioni con i genitori e la situazione socio-economica.

Rispetto alla struttura familiare, si conferma la netta prevalenza di nuclei in cui sono presenti entrambi i genitori, con o senza nonni o in famiglie ricostituite. Non è tuttavia possibile trascurare il fatto che le situazioni alternative (monoparentali o senza genitori) rappresentano ormai un 16% circa delle realtà in cui vivono e crescono i ragazzi; realtà assodate, di cui occorre tenere conto nella programmazione delle politiche familiari e sociali, in quanto situazioni a rischio di svantaggio economico e sociale. Il dato è stabile rispetto al 2014.

La qualità della relazione con i genitori, intesa come facilità a parlare con loro di aspetti importanti della propria vita, tende a ridursi con l'età, risultando più bassa fra i

quindicenni che fra gli undicenni. Dato comprensibile, se si considera che l'adolescenza è l'età in cui inizia il distacco dalla famiglia, per avvicinarsi ad altri gruppi. Da rilevare che per entrambi i generi e a tutte le età, il rapporto con la madre è considerato più facile. Rispetto alle rilevazioni precedenti si mantiene una tendenza al miglioramento delle relazioni con il padre fra i quindicenni.

Per quanto riguarda la situazione socio-economica, si registrano, in generale, possibilità di consumo medio-alte, seppur in presenza di situazioni di disagio in un quarto della popolazione giovanile. Da notare che rispetto al 2008 è presente uno scivolamento verso il basso dello status socio-economico espresso dall'indicatore FAS con una diminuzione dei ragazzi che si situano nel livello di FAS medio o alto (complessivamente 6 punti percentuali) e un proporzionale aumento delle percentuali per il livello FAS basso. Il dato è rilevante ed occorre tenerne conto nell'organizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie, per l'importanza che lo status socioeconomico esercita sullo stato di salute presente e futuro dei giovani.

Cos'è cambiato rispetto alle rilevazioni precedenti?

	2004	2008	2014	2018
Figli unici	23,8%	19%	19,4%	16%
Famiglie con entrambi i genitori o ricostituite (con o senza nonni)	90,3%	90,7%	83,9%	84,2%
Facile o molto facile parlare con il padre (11 anni)	66,2%	66,5%	70,9%	70,8%
Facile o molto facile parlare con il padre (15 anni)	42,3%	45,5%	47,3%	49,4%
Facile o molto facile parlare con la madre (11 anni)	85,4%	86,3%	86,8%	87,3%
Facile o molto facile parlare con la madre (15 anni)	67,3%	69,1%	79,6%	71,9%
Status socioeconomico basso (FAS)	17,2%	14,5%	18,8%	24,8%

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹ Sawyer SM, Afifi RA, Bearinger LH, Blakemore S, Dick B, Ezech AC, Patton GC. Adolescence: a foundation for future health. *Lancet*. 2012; 378(9826): 1630-1640
- ² Santrock, J.W. (2014). *Adolescence* (15th Edition). New York, NY: McGraw-Hill Education
- ³ Collins WA, Steinberg L. Adolescent development in interpersonal context. In: Eisenberg N, Damon W, Lerner RM, editors. *Handbook of child psychology*. Vol. 3. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons Inc.; 2006:1003–67
- ⁴ Luciano M, Sampogna G, del Vecchio V, Giacco D, Mulè A, de Rosa C, Fiorillo A, Maj M. The family in Italy: cultural changes and implications for treatment, *Int Rev Psychiatry*. 2012;24(2):149-56
- ⁵ ISTAT (2018). *Popolazione e Famiglie Anno 2018*. Roma, ISTAT.
- ⁶ Levin KA, Dallago L, Currie C. The association between adolescent life satisfaction, family structure, family affluence and gender differences in parent–child communication. *Soc Indic Res*. 2012;106(2):287–305
- ⁷ Cooper, C., P. E. Bebbington, H. Meltzer, D. Bhugra, T. Brugha, R. Jenkins, M. Farrell, and M. King. 2008. "Depression and Common Mental Disorders in Lone Parents: Results of the 2000 National Psychiatric Morbidity Survey." *Psychological Medicine*, 38 (3): 335–342
- ⁸ Targosz, S., Bebbington, P., Lewis, G., Brugha, T., Jenkins, R., Farrel, M., Meltzer, H. (2003). Lone mothers, social exclusion and depression. *Psychol Med*, 33: 715–722
- ⁹ Mazzucco, S., Mencarini, L. & Rettaroli, R. (2006). Similarities and differences between two cohorts of young adults in Italy: Results of a CATI survey on transition to adulthood. *Demographic Research*, 15, 105–146
- ¹⁰ Dashiff, C., W., Di Micco, B., Myers and K., Sheppard. 2009. "Poverty and Adolescent Mental Health." *Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing*, 22: 23–32
- ¹¹ Cavanagh, S. E., and A. C. Huston. 2008. "The Timing of Family Instability and Children's Social Development." *Journal of Marriage and Family*, 70 (5): 1258–1270
- ¹² Levin KA, Currie C. Family structure, mother–child communication, father–child communication, and adolescent life satisfaction: a cross-sectional multilevel analysis. *Health Educ*. 2010;110(3):152–68
- ¹³ Dallago L., Santinello M. (2006). Comunicazione familiare: quando funziona con un solo genitore. *Psicologia Clinica dello Sviluppo*, 2: 241-261.
- ¹⁴ Zambon A., Lemma P., Borraccino A., Dalmasso P., Cavallo F. (2006), Socio-economic position and adolescents' health in Italy: the role of the quality of social relations, *European Journal of Public Health*, 16: 627-632.
- ¹⁵ Cava MJ, Buelga S, Musitu G. Parental communication and life satisfaction in adolescence. *Span J Psychol* 2014; 17:E98
- ¹⁶ Gutman, L. M., Eccles, J. S., Peck, S., & Malanchuk, O. (2011). The influence of family relations on trajectories of cigarette and alcohol use from early to late adolescence. *Journal of Adolescence*, 34(1), 119-128
- ¹⁷ Gallarin M, Alonso-Arbiol I. Parenting practices, parental attachment and aggressiveness in adolescence: a predictive model. *J Adolesc*. 2012;35(6):1601–10
- ¹⁸ Demidenko N, Manion I, Lee CM. Father–daughter attachment and communication in depressed and nondepressed adolescent girls. *J Child Fam Stud*. 2015;24:1727–34.
- ¹⁹ Vieno A., Nation M., Pastore M., Santinello M. (2009). Parenting and Antisocial Behavior: A Model of the Relations between Adolescent Self-Disclosure, Parental Closeness, Parental Control, and Adolescent Antisocial Behavior. *Developmental Psychology*, 45:1509-1519.
- ²⁰ Ackerman, R.A., Kashy, D.A., Donnellan, M.B., Neppl, T., Lorenz, F.O., & Conger, R.D. (2013). The Interpersonal Legacy of a Positive Family Climate in Adolescence. *Psychological Science*, 24(3): 243-250
- ²¹ Small ML, Morgan N, Bailey-Davis L, Maggs JL. The protective effects of parent–college student communication on dietary and physical activity behaviors. *J Adolesc Health* 2013;53(2):300–2.
- ²² Rostad WL, Silverman P, McDonald MK. Daddy's little girl goes to college: an investigation of females' perceived closeness with fathers and later risky behaviors. *J Am Coll Health*. 2014;62(4):213-20
- ²³ Bulanda RE, Majumdar D. Perceived parent–child relations and adolescent self-esteem. *J Child Fam Stud*. 2009;18(2):203–12. 10. Cava M-J, Buelga S, Musitu G. Parental communication and life satisfaction in adolescence. *Span J Psychol*. 2014;17
- ²⁴ Elgar FJ, Britt McKinnon, Torbjørn Torsheim, Christina Warrner Schnohr, Joanna Mazur, Franco Cavallo, Candace Currie (2016) Patterns of Socioeconomic Inequality in Adolescent Health Differ According to the Measure of Socioeconomic Position, *Social Indicators Research* 2016, Volume 127, Issue 127, pp 1169–1180
- ²⁵ Kerr M, Stattin H, Biesecker G, et al. Lerner RM, Easterbrooks MA, Mistry J. Relationships With Parents and Peers in Adolescence, *Handbook of psychology*, Vol. 6, Developmental psychology, 2003 NJ John Wiley & Sons
- ²⁶ Hoskins D, (2014) , Consequences of Parenting on Adolescent Outcomes, *Societies* 2014, 4, 506–531
- ²⁷ Viner RM, Ozer EM, Denny S, Marmot M, Resnick M, Fatusi A, Currie C. Adolescence and the social determinants of health, *The Lancet* 2012; 379(9826): 1641-1652
- ²⁸ Currie CE, Elton RA, Todd J, Platt S. Indicators of socio-economic status for adolescents: the WHO Health Behaviour in School-Aged Children Survey. *Health Education Research*. 1997;12(3):385–397

3. L'AMBIENTE SCOLASTICO

INTRODUZIONE

In adolescenza, l'ambiente scolastico rappresenta un contesto di sviluppo privilegiato in quanto ambiente sociale prossimale in cui l'individuo trascorre buona parte della propria quotidianità equindi in grado di influenzarne l'adattamento e il benessere.

Il contesto scolastico può agire infatti supportando l'adolescente nel suo percorso di crescita, rappresentando una fonte significativa di sostegno sociale (soprattutto rispetto alle relazioni che si instaurano con coetanei e insegnanti) e favorendo l'acquisizione di competenza, autonomia e capacità di coinvolgimento. Inoltre, un contesto accogliente e supportivo è in grado di stimolare l'indipendenza dell'individuo e la sua partecipazione ai processi decisionali¹.

La scuola può, dunque, rappresentare un contesto positivo di crescita e di promozione del benessere, sia a livello psico-sociale che in relazione a comportamenti legati alla salute.

Obiettivo di questo capitolo è, da un lato, approfondire la percezione del contesto scolastico attraverso una lettura descrittiva delle risposte date dai ragazzi ad alcuni items relativi al loro rapporto con gli insegnanti, con i compagni di classe e con la scuola in generale e, dall'altro, approfondire le caratteristiche (in senso strutturale e organizzativo) del contesto scolastico che i ragazzi sperimentano attraverso una lettura descrittiva delle risposte date dai dirigenti scolastici.

STRUTTURA SCOLASTICA, ORGANIZZAZIONE INTERNA E PROMOZIONE DEL BENESSERE

Le caratteristiche strutturali e organizzative della scuola sono in grado di influenzare il benessere e l'adattamento dell'adolescente². È stato chiesto ai dirigenti scolastici di rispondere ad alcune domande che potessero evidenziare le caratteristiche della scuola in termini di aspetti strutturali e organizzativi e in termini di misure di promozione alla salute adottate, per poter accostare queste informazioni a quelle rilevate dagli studenti, favorendo una miglior comprensione delle differenze negli esiti di salute e comportamenti ad essa associati dei ragazzi.

Nella tabella 3.1 si riportano alcune delle informazioni fornite dai Dirigenti scolastici circa le risorse strutturali della scuola e loro adeguatezza rispetto ai bisogni.

TABELLA 3.1 RISORSE STRUTTURALI DELLA SCUOLA E LORO ADEGUATEZZA (%)


	Completamente d'accordo	D'accordo	In disaccordo	Completamente in disaccordo
IL CORTILE È IN BUONE CONDIZIONI	13,3	52,5	26,7	3,3
LA PALESTRA È IN BUONE CONDIZIONI	7,5	56,7	22,5	5,8
I LABORATORI DIDATTICI SONO ATTREZZATI	10,7	47,1	28,9	4,1
LE CLASSI SODDISFANO I BISOGNI DI INSEGNANTI E ALUNNI	6,7	66,7	21,7	3,3
LA SCUOLA NECESSITA DI RESTAURO	19,2	43,3	29,2	6,7

Dalla lettura dei dati presenti in tabella 3.1 emerge una fotografia della situazione strutturale degli istituti d'istruzione coinvolti nell'indagine: due terzi dei Dirigenti Scolastici concordano sulla necessità di sottoporre la propria scuola a restauri e un quarto non è d'accordo sull'adeguatezza delle classi nel soddisfare il bisogno di insegnanti e alunni.

In alcuni casi i dirigenti segnalano l'assenza delle risorse strutturali indicate (palestra nel 6% dei casi, cortile nel 3% dei casi, laboratori attrezzati nel 7% dei casi).


Il questionario rivolto ai Dirigenti scolastici ha permesso di esplorare anche le eventuali attività di promozione alla salute adottate dalla scuola per favorire negli studenti lo sviluppo e l'acquisizione di competenze in aree significative per il benessere (figura 3.1)

Figura 3.1 Misure di promozione alla salute adottate dalla scuola per favorire negli studenti lo sviluppo di competenze in aree significative per il benessere (%)



Una specifica sezione del questionario intendeva indagare il grado di partecipazione degli allievi ad alcuni degli aspetti organizzativi dell'istituzione scolastica (figura 3.2)

Figura 3.2 Frequenza del coinvolgimento degli studenti in alcuni aspetti dell'organizzazione scolastica (%)




La lettura dei dati presenti in figura 3.2 suggerisce un coinvolgimento discontinuo degli studenti: in più della metà dei casi sono coinvolti nello sviluppo di politiche o regole scolastiche (27% quasi sempre; 50% spesso) e la loro opinione è considerata nelle decisioni che competono la scuola (45,5% quasi sempre; 38% spesso), mentre meno frequentemente sono coinvolti nello sviluppo di misure di promozione della salute (38% qualche volta; 13% raramente/mai) e nella pianificazione di eventi scolastici (37,5% qualche volta; 14% raramente/mai)

In merito alle modalità scelte dalle scuole per consentire l'espressione di lamentele, una sezione del questionario poneva la seguente domanda ai Dirigenti Scolastici: «Nella vostra scuola disponete di strutture o spazi formali che gli studenti possono utilizzare per rivolgere al preside preoccupazioni e lamentele?». Dalle risposte al questionario emerge che, nella maggior parte dei casi, non esistono cassette per i suggerimenti (82%) o modalità informatiche che possano convogliare le eventuali lamentele (84%), mentre una prassi spesso seguita (63,5% dei casi) è quella di svolgere indagini sugli studenti. L'istituzione si mostra però molto disponibile all'accoglienza degli studenti nelle ore d'ufficio (83 %).

I Dirigenti scolastici hanno inoltre potuto esprimere un giudizio circa la percezione, in termini di rilevanza, di alcune problematiche dell'area in cui è situata la scuola (figura 3.3) e dell'adeguatezza del quartiere in cui si trova la scuola (figura 3.4).

Figura 3.3 Frequenza in termini di rilevanza di alcune problematiche a livello dell'area in cui è situata la scuola (%)




Non emergono situazioni di problematicità allarmanti. Il problema più importante è risultato essere la presenza di traffico, ritenuto rilevante dal 7,5% dei Dirigenti scolastici e moderato dal 18% degli stessi. Per importanza e gravità seguono la presenza di violenza (4,2%), e la presenza di criminalità (2,5%).

La presenza di spaccio e il consumo di sostanze vengono considerati un problema moderato dal 23% dei dirigenti.

Più critica la valutazione delle aree urbane in cui si colloca la scuola, in merito alla presenza di risorse (fig.3.4)

Figura 3.4 Valutazione dell'adeguatezza del quartiere in cui opera la scuola (%)



Il quartiere in cui opera la scuola appare poco o per nulla adeguato quale luogo d'incontro per giovani (47%) e per i trasporti pubblici (34,7%), mentre per il 29% degli intervistati risultano adeguati ("molto adeguati/adequati") i luoghi per l'attività sportiva.

Ai Dirigenti scolastici è stato inoltre chiesto di esprimere una valutazione delle attività e delle manifestazioni disponibili nel quartiere in cui opera la scuola (tabella 3.3)

TABELLA 3.3 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLE MANIFESTAZIONI NEL QUARTIERE IN CUI OPERA LA SCUOLA (%)

	Poche iniziative culturali	Mancanza punti di ritrovo	Molte associazioni che operano nel sociale
COMPLETAMENTE IN DISACCORDO	5	0,8	2,5
IN DISACCORDO	25	22,7	10,2
ABBASTANZA IN DISACCORDO	20	21	6,8
NÉ' IN ACCORDO NÉ' IN DISACCORDO	15,8	17,7	13,6
ABBASTANZA D'ACCORDO	18,3	18,5	40,7
D'ACCORDO	11,7	15,1	24,6
COMPLETAMENTE D'ACCORDO	4,2	4,2	1,7

Alla richiesta di valutare le attività e le manifestazioni nel quartiere in cui opera la scuola, più di un terzo dei Dirigenti ritiene che manchino nel quartiere iniziative culturali (34,2% risponde da abbastanza d'accordo a completamente d'accordo) e punti di ritrovo per i giovani, (37,8%), mentre due terzi concordano sulla presenza di molte associazioni operanti nel sociale (67% risponde da abbastanza d'accordo a completamente d'accordo).

RAPPORTO CON GLI INSEGNANTI

La qualità del rapporto con gli insegnanti è considerata una delle componenti che maggiormente contribuisce all'adattamento scolastico dell'adolescente³⁻⁴.

Una relazione positiva con i propri insegnanti è associata ad un maggior utilizzo di strategie di coping attivo a scuola¹, è predittiva di un migliore adattamento comportamentale e scolastico⁵⁻⁶, ed influenza il successo scolastico⁷⁻⁸.

Alcuni studi hanno inoltre evidenziato come una relazione positiva con gli insegnanti contribuisca a contenere i comportamenti aggressivi⁹ e rappresenti un fattore protettivo per l'assunzione di comportamenti a rischio¹⁰⁻¹¹.

Al fine di comprendere quale sia la percezione che i ragazzi hanno del rapporto con gli insegnanti è stato chiesto loro di esprimere il proprio grado di accordo (da "molto d'accordo" a "per niente d'accordo") rispetto alle seguenti affermazioni: "I miei insegnanti si interessano a me come persona", "Ho molta fiducia nei miei insegnanti" e "I miei insegnanti mi accettano per quello che sono".

Nella tabelle 3.4, 3.5 e 3.6 sono riportate le risposte dei ragazzi a ciascuna domanda.

TABELLA 3.4 GRADO DI ACCORDO DICHIARATO CON L'AFFERMAZIONE "I MIEI INSEGNANTI SI INTERESSANO A ME COME PERSONA", PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MOLTO D'ACCORDO	19,1	11,6	6,2
D'ACCORDO	40	37,5	27,4
NÉ IN ACCORDO NÉ IN DISACCORDO	29,4	38,4	44,1
NON D'ACCORDO	8	9,9	16
PER NIENTE D'ACCORDO	3,5	2,6	6,3

TABELLA 3.5 GRADO DI ACCORDO DICHIARATO CON L'AFFERMAZIONE "HO MOLTA FIDUCIA NEI MIEI INSEGNANTI", PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MOLTO D'ACCORDO	39,7	18,8	5,6
D'ACCORDO	36,4	40,9	31,6
NÉ IN ACCORDO NÉ IN DISACCORDO	17,3	27,7	39,1
NON D'ACCORDO	3,9	8,7	16,3
PER NIENTE D'ACCORDO	2,6	3,9	7,5


TABELLA 3.6 GRADO DI ACCORDO DICHIARATO CON L’AFFERMAZIONE “I MIEI INSEGNANTI MI ACCETTANO PER QUELLO CHE SONO”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MOLTO D’ACCORDO	49,2	33,3	17,3
D’ACCORDO	37,2	42,9	48,4
NÉ IN ACCORDO NÉ IN DISACCORDO	10,1	19	25,6
NON D’ACCORDO	2	3,3	6
PER NIENTE D’ACCORDO	1,5	1,5	2,6

Mentre la fascia di ragazzi più giovane (11 anni) è per la maggioranza ‘d’accordo’ o ‘molto d’accordo’ (59%) che gli insegnanti si interessino a loro come persone, tale percezione diminuisce con l’avanzare dell’età. Meno della metà dei ragazzi di 13 e 15 anni è ‘d’accordo’ o ‘molto d’accordo’ (49% dei 13enni e 34% dei 15 enni). Andamento simile ha anche la fiducia negli insegnanti (76% degli undicenni è d’accordo o molto d’accordo contro il 37% dei quindicenni). La percezione di essere accettati per quello che si è, viene condivisa dalla maggioranza degli studenti, con un calo al crescere dell’età (86% degli undicenni, 76% degli tredicenni, 66% dei quindicenni).

Nella figura 3.5 si può cogliere a colpo d’occhio come il grado di “accordo” o “molto d’accordo” con le singole affermazioni riportate nelle tabelle precedenti sia differente nelle diverse età considerate.

Figura 3.5 Frequenza di ragazzi che dichiarano di essere “d’accordo” o “molto d’accordo” con le tre affermazioni sul modo con cui interagiscono con gli insegnanti, per età (%)



Le percentuali di coloro che si dichiarano d’accordo o molto d’accordo con le affermazioni circa il loro rapporto con gli insegnanti diminuisce con l’avanzare dell’età.

RAPPORTO CON I COMPAGNI DI CLASSE

Il rapporto con i pari all'interno della scuola gioca un ruolo chiave nello sviluppo dell'adolescente^{6,12}. Questo sistema relazionale sembra influenzare il coinvolgimento degli studenti nelle attività scolastiche, e la motivazione al raggiungimento di buoni risultati. Esiste infatti un legame tra relazioni con i coetanei e rendimento scolastico: gli studenti con relazioni carenti con i propri compagni di classe tendono ad avere voti peggiori¹³, mentre avere amici a scuola sembra aumentare il coinvolgimento e la partecipazione ad attività scolastiche¹⁴ e favorire lo sviluppo di comportamenti socialmente adeguati e l'impegno scolastico¹⁵.

Per valutare il rapporto dei ragazzi con i compagni di classe, è stato chiesto loro di indicare il grado d'accordo con le seguenti affermazioni *“La maggior parte dei miei compagni di classe è gentile e disponibile”* e *“I miei compagni mi accettano per quello che sono”*. (modalità di risposta da *“sono molto d'accordo”* a *“non sono per niente d'accordo”*). Nelle tabelle 3.7 e 3.8 sono state riportate le risposte relative alle affermazioni.

TABELLA 3.7 GRADO DI ACCORDO DICHIARATO CON L'AFFERMAZIONE “LA MAGGIOR PARTE DEI MIEI COMPAGNI È GENTILE E DISPONIBILE”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MOLTO D'ACCORDO	28,1	17	13,1
D'ACCORDO	37,6	40,1	45,8
NÉ IN ACCORDO NÉ IN DISACCORDO	23,4	27,5	26,5
NON D'ACCORDO	7,3	11,5	11,3
PER NIENTE D'ACCORDO	3,5	3,9	3,2

TABELLA 3.8 GRADO DI ACCORDO DICHIARATO CON L'AFFERMAZIONE “I MIEI COMPAGNI MI ACCETTANO PER QUELLO CHE SONO”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MOLTO D'ACCORDO	40,1	29	23,6
D'ACCORDO	34,8	41,9	47,8
NÉ IN ACCORDO NÉ IN DISACCORDO	16,2	19,5	20,1
NON D'ACCORDO	3,7	6,1	5,7
PER NIENTE D'ACCORDO	5,1	3,5	2,8

Come si evince dalla lettura della tabella 3.7, la percentuale di ragazzi che sono molto d'accordo con l'affermazione *“La maggior parte dei miei compagni è gentile e disponibile”* diminuisce con l'età (28,1% degli undicenni contro il 13,1% dei quindicenni), mentre si registra un lieve aumento con l'età fra quanti sono d'accordo.

Andamento simile ha anche la percezione di essere accettati dai propri compagni: sono molto d'accordo con questa affermazione il 40,1% degli undicenni contro il 23,6% dei quindicenni. Fra quanti sono d'accordo si registra un aumento con l'età (34,8 degli undicenni contro il 47,8 dei quindicenni).

La percezione dei rapporti con i propri compagni è differente tra i maschi e le femmine (figura 3.6 e 3.7), che si sentono meno accettate dai pari, in particolare le quindicenni.

Figura 3.6 Frequenza di coloro che sono molto d'accordo o d'accordo con l'affermazione: "la maggior parte dei miei compagni è gentile e disponibile", per età e genere (%)





Figura 3.7 Frequenza di coloro che sono molto d'accordo o d'accordo con l'affermazione: "i miei compagni mi accettano per quello che sono": per età e genere (%)



BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il recente report dell'Unesco¹⁶ che descrive il fenomeno del bullismo in 71 paesi del mondo dice che l'Italia è tra i paesi a minore prevalenza ed è nel gruppo di quelli con trend in riduzione. Il fenomeno è maggiormente rappresentato nelle fasce d'età più giovani e si manifesta in modo differente tra i due generi: manifestazioni più frequentemente di tipo fisico nei maschi e di tipo verbale e psicologico nelle ragazze¹⁶. Per quel che riguarda il fenomeno del cyber bullismo, ancora poco esplorato, in un recente lavoro che ha coinvolto 7 paesi tra cui l'Italia, il fenomeno sembra essere in aumento¹⁷. Non vengono descritte differenze di genere per gli atti legati alla diffusione di foto o di immagini mentre il genere femminile risulta essere più esposto di quello maschile per gli episodi legati all'utilizzo e la diffusione di messaggi di testo. Il cyberbullismo, a differenza del bullismo, sembra aumentare al crescere dell'età probabilmente in parte a causa della maggiore disponibilità di mezzi tecnologici nei ragazzi più grandi. La letteratura sottolinea come non sia ancora possibile discutere se esista una correlazione tra bullismo in riduzione, e cyberbullismo in aumento e se quest'ultimo sia un fenomeno nuovo e indipendente oppure la transizione del bullismo¹⁸.

Un clima positivo tra pari e buone relazioni con le figure adulte di riferimento, soprattutto insegnanti, riducono la probabilità di accadimento di atti lesivi e risultano quindi un forte fattore protettivo¹⁸. Le dinamiche relazionali che i ragazzi costruiscono a scuola e nelle attività strutturate al di fuori della scuola sono un ulteriore elemento protettivo¹⁶.


La sorveglianza HBSC ha approfondito il tema del bullismo e delle relazioni violente chiedendo ai ragazzi con quale frequenza avessero subito atti di bullismo a scuola nel corso degli ultimi due mesi. La modalità di risposta si distribuisce su una scala a 5 punti da "Mai" a "Più volte alla settimana" (tabella 3.9)

TABELLA 3.9 QUANTE VOLTE HAI SUBITO ATTI DI BULLISMO NEGLI ULTIMI DUE MESI, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
NON SONO STATO OGGETTO DI BULLISMO	84,3	87,7	91,5
UNA O DUE VOLTE	9,9	8	5,9
DUE O TRE VOLTE AL MESE	2,8	1,9	1,3
CIRCA UNA VOLTA ALLA SETTIMANA	0,7	1,1	0,6
PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA	2,3	1,2	0,7

La maggior parte dei ragazzi (87,2%), a prescindere dall'età, non ha subito episodi di bullismo. Il fenomeno, quando presente, interessa maggiormente i ragazzi rispetto alle ragazze e decresce con l'età (figura 3.8).

Figura 3.8 Frequenza di coloro che dichiarano di non aver mai subito atti di bullismo negli ultimi 2 mesi, per età e genere (%)



La percentuale di ragazzi e ragazze che dichiara di non aver mai subito atti di bullismo aumenta con l'età.


Oltre al bullismo subito, è stato anche chiesto ai ragazzi se avessero mai partecipato ad atti di bullismo contro un pari negli ultimi due mesi.

TABELLA 3.10 QUANTE VOLTE HAI PARTECIPATO AD ATTI DI BULLISMO CONTRO UN TUO PARI NEGLI ULTIMI DUE MESI, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
NON HO FATTO IL BULLO CON UN COMPAGNO	91,2	88,4	91,5
UNA O DUE VOLTE	6,3	8,8	5,8
DUE O TRE VOLTE AL MESE	1,7	1,7	1,7
CIRCA UNA VOLTA ALLA SETTIMANA	0,5	1,1	0,2
PIÙ VOLTE ALLA SETTIMANA	0,3	0	0,8


Nella tabella 3.10 e nella figura 3.9 si evidenzia che la maggior parte dei ragazzi (90%), a prescindere dall'età, non ha praticato episodi di bullismo verso un compagno negli ultimi due mesi.

Figura 3.9 Frequenza di coloro che dichiarano di non aver mai partecipato ad atti di bullismo contro un compagno negli ultimi 2 mesi, per età e genere (%)




Il Cyberbullismo, una forma di bullismo condotto attraverso strumenti telematici (ad esempio tramite in internet), è stato oggetto dell'indagine 2018. Anche in questo caso, attraverso due domande specifiche, è stato chiesto ai ragazzi se hanno subito e/o partecipato ad azioni di cyberbullismo.

Figura 3.10 Frequenza di coloro che dichiarano di non aver mai subito azioni di cyberbullismo negli ultimi 2 mesi, per età e genere (%)



Nelle figure 3.10 e 3.11 si evidenzia che la maggior parte dei ragazzi, a prescindere dall'età, non mai ha subito azioni di cyberbullismo (94% dei maschi e 90,5% delle femmine), né le ha mai praticate (93,5% dei maschi e 93,7% delle femmine).

Figura 3.11 Frequenza di coloro che dichiarano di non aver mai praticato azioni di cyberbullismo negli ultimi 2 mesi, per età e genere (%)



Ai ragazzi è stato inoltre chiesto se fossero incorsi in colluttazioni violente (“ti sei azzuffato o picchiato con qualcuno?”) negli ultimi 12 mesi. Nella Tabella 3.11 sono riportate le risposte fornite dai ragazzi, suddivise per fascia d’età.

TABELLA 3.11 NEGLI ULTIMI 12 MESI, QUANTE VOLTE TI SEI AZZUFFATO O PICCHIATO CON QUALCUNO?” PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MAI	64	59,3	67,3
UNA VOLTA	17,9	18,4	17
DUE VOLTE	8,1	10,1	7,5
TRE VOLTE	2,1	3,8	3,1
QUATTRO VOLTE O PIÙ	7,9	8,3	5,2

La tabella mostra che la maggioranza degli studenti intervistati (63,1%) non è mai stato coinvolto in colluttazioni violente.

LA SCUOLA

La scuola rappresenta un contesto educativo in cui gli adolescenti trascorrono buona parte della giornata. Per questo è importante considerare le relazioni che l'individuo, in questa fascia d'età, intrattiene con i diversi attori del contesto scolastico (in particolare insegnanti e pari), ma anche con il "contesto scuola" in senso più ampio e complessivo.


In questo studio, il rapporto dei ragazzi con la scuola è stato indagato chiedendo loro cosa pensassero della scuola. La modalità di risposta a questa domanda è distribuita su una scala a 4 punti da "mi piace molto" a "non mi piace per niente". In tabella 3.12 si possono osservare le risposte relative a ciò che i ragazzi pensano della scuola nella nostra regione, suddivise per età.

TABELLA 3.12 "ATTUALMENTE COSA PENSI DELLA SCUOLA?", PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MI PIACE MOLTO	17,4	7,5	7,8
ABBASTANZA	53,4	51,4	55,9
NON TANTO	19	29,9	28,4
NON MI PIACE PER NULLA	10,2	11,2	8,0

In figura 3.12 è possibile notare le differenze di genere circa le risposte "mi piace molto/abbastanza" la scuola.

Figura 3.12 Frequenza di coloro a cui piace "molto" o "abbastanza" la scuola, per età e genere (%)



Complessivamente i dati evidenziano come il rapporto dei ragazzi con la scuola tenda a peggiorare al crescere dell'età. Il giudizio positivo sulla scuola risulta più diffuso tra le ragazze in ogni fascia di età (69,4% delle ragazze contro il 60,9% dei maschi).

Anche l'eventuale stress causato dalla scuola è stato indagato chiedendo ai ragazzi di esprimere il loro giudizio tramite una scala a 4 punti da "per niente stressato" a "molto stressato".

In tabella 3.13 e 3.14 si possono osservare le risposte dei ragazzi della nostra regione, suddivise rispettivamente per età e per genere.

TABELLA 3.13 “QUANTO TI SENTI STRESSATO DA TUTTO IL LAVORO CHE DEVI FARE PER LA SCUOLA?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
PER NIENTE	9,4	6,1	5,0
UN PÒ	47	38	29,7
ABBASTANZA	26	36,5	35,5
MOLTO	17,6	19,5	29,7

TABELLA 3.14 “QUANTO TI SENTI STRESSATO DA TUTTO IL LAVORO CHE DEVI FARE PER LA SCUOLA?”, PER ETÀ E GENERE (%)

	11 anni (%)		13 anni (%)		15 anni (%)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
PER NIENTE	10	8,6	8,2	3,8	7,2	2,5
UN PÒ	46,1	48	41,1	34,5	34,1	24,5
ABBASTANZA	25,9	26,2	34,2	39	37	33,7
MOLTO	18	17,2	16,5	22,8	21,7	39,2

CONCLUSIONI

La sorveglianza disegna un quadro delle scuole del Piemonte abbastanza variegato: dal punto di vista strutturale circa due terzi delle scuole hanno spazi e strutture adeguati, anche se richiederebbero restauri. Da segnalare in alcuni casi l'assenza di laboratori, palestra o cortili.

Si rileva anche attenzione alle attività di promozione alla salute, adottate per favorire negli studenti lo sviluppo e l'acquisizione di competenze in aree significative per il benessere, principalmente in attività fisica e sport e, in circa la metà delle scuole, anche nell'ambito delle competenze nutrizionali o relative alle sostanze. Positivo anche il grado di coinvolgimento degli studenti nelle politiche scolastiche, anche se in modo ancora un po' discontinuo (più spesso sulle regole, meno nella pianificazione della promozione della salute o di eventi scolastici).

La percezione di un ambiente scolastico sostenente, caratterizzato da buoni rapporti con i pari e con i propri insegnanti, è solitamente correlato ad un maggior piacere e motivazione nelle attività scolastiche ed è inoltre protettivo rispetto all'assunzione di comportamenti a rischio.

La scuola è percepita come luogo “piacevole” dalla maggior parte degli studenti piemontesi, e le relazioni che qui si costruiscono sono in linea di massima positive e fonte di sostegno. Questo è vero in particolare per gli studenti più giovani, che dichiarano un buon rapporto con gli insegnanti, da cui si sentono accettati e verso cui nutrono fiducia (rispettivamente 86% undicenni e 66% quindicenni; 76% undicenni e

37% quindicenni). Con il passaggio dai 13 ai 15 anni il rapporto con la scuola è vissuto in maniera meno positiva, ed anche le relazioni che in essa si intrattengono sembrano diventare più difficili. Si registra comunque, rispetto alle rilevazioni precedenti, un maggior gradimento della scuola. Anche i compagni sono vissuti come gentili e disponibili: lo pensa la maggior parte dei ragazzi (61%), che si sentono anche accettati dai pari per quello che sono (73%).

Per quanto riguarda il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, la maggior parte degli studenti dichiara di non aver mai subito (86%) o fatto (90%) atti di bullismo, né subito (93%) o fatto (94%) atti di cyberbullismo negli ultimi due mesi. Tuttavia non è trascurabile la percentuale di chi né è stato vittima almeno una volta (circa un ragazzo o una ragazza su 10): queste forme di prevaricazione ripetute possono essere fonte, per le vittime, di una progressiva perdita di autostima e del benessere scolastico.

Un'ultima considerazione è la divergenza che si osserva tra ragazze e ragazzi nelle relazioni con i compagni, per cui le femmine sembrano sentire le relazioni con i pari come meno accoglienti e più giudicanti.

Cos'è cambiato rispetto alle rilevazioni precedenti?

	2004	2008	2014	2018
Ho molta fiducia nei miei insegnanti (d'accordo o molto d'accordo) (11 anni)	-	-	77,4%	76,1%
Ho molta fiducia nei miei insegnanti (d'accordo o molto d'accordo) (15 anni)	-	-	37,2%	37,2%
La maggior parte dei miei compagni è gentile e disponibile (d'accordo o molto d'accordo) (11 anni)	74,2%	70,5%	64,9%	65,7%
La maggior parte dei miei compagni è gentile e disponibile (d'accordo o molto d'accordo) (15 anni)	56,6%	60,7%	55,9%	58,9%
I miei compagni mi accettano per quello che sono (d'accordo o molto d'accordo) (11 anni)	77,8%	79,7%	77,4%	74,9%
I miei compagni mi accettano per quello che sono (d'accordo o molto d'accordo) (15 anni)	69,9%	72,1%	71,2%	71,4%
Ha subito almeno una volta atti di bullismo a scuola negli ultimi due mesi (11 anni)	26,4%	15,2%	20%	15,7%
Ha subito almeno una volta atti di bullismo a scuola negli ultimi due mesi (15 anni)	10%	8,1%	5,4%	8,5%
Mi piace la scuola (molto o abbastanza) (11 anni)	63,3%	69,5%	68,6%	70,8%
Mi piace la scuola (molto o abbastanza) (15 anni)	53,3%	56,3%	62,7%	63,7%

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹Zimmer-Gembeck M.J., Locke E.M. (2007). The socialization of adolescent coping behaviours: relationships with families and teachers. *Journal of Adolescence*, 30: 1–16.
- ²Crosnoe R., Needham B. (2004). Holism, Contextual variability and the Study of friendship in adolescent development. *Child Development*, 75: 264, 279.
- ³Vieno A, Santinello M, Pastore M, Perkins DD. Social support, sense of community in school, and self-efficacy as resources during early adolescence: an integrative model. *Am J Community Psychol*. 2007;39:177-90.
- ⁴Longobardi C, Prino LE, Marengo D, Settanni M. Student-Teacher Relationships As a Protective Factor for School Adjustment during the Transition from Middle to High School. *Front Psychol*. 2016; 23;7:1988.

- ⁵Hamre BK, Pianta RC. Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. *Child Dev.* 2001;72:625-38.
- ⁶ Wang C, Hatzigianni M, Shahaeian A, Murray E, Harrison LJ. The combined effects of teacher-child and peer relationships on children's social-emotional adjustment. *J Sch Psychol.* 2016;59:1-11.
- ⁷Graziano PA, Reavis RD, Keane SP, Calkins SD. The Role of Emotion Regulation and Children's Early Academic Success. *J Sch Psychol.* 2007;45:3-19.
- ⁸Hamre BK, Pianta RC. Early teacher-child relationships and the trajectory of children's school outcomes through eighth grade. *Child Development.* 2001;72:625-638.
- ⁹Hughes JN, Cavell TA, Jackson T. Influence of the teacher-student relationship on childhood conduct problems: a prospective study. *J Clin Child Psychol.* 1999;28:173-84.
- ¹⁰de Jong EM, Koomen HMY, Jellesma FC, Roorda DL. Teacher and child perceptions of relationship quality and ethnic minority children's behavioral adjustment in upper elementary school. *J Sch Psychol.* 2018;70:27-43.
- ¹¹Dudovitz RN, Chung PJ, Wong MD. Teachers and Coaches in Adolescent Social Networks Are Associated With Healthier Self-Concept and Decreased Substance Use. *J Sch Health.* 2017;87:12-20.
- ¹²Lemma P, Borraccino A, Berchiolla P, Dalmasso P, Charrier L, Vieno A, Lazzeri G, Cavallo F. Well-being in 15-year-old adolescents: a matter of relationship with school. *J Public Health.* 2015;37:573-80.
- ¹³Zettergren P. School adjustment in adolescence for previously rejected, average and popular children. *Br J Educ Psychol.* 2003;73:207-21.
- ¹⁴Lynch AD, Lerner RM, Leventhal T. Adolescent academic achievement and school engagement: An examination of the role of school-wide peer culture. *Journal of Youth and Adolescence.* 2013;42:6-19.
- ¹⁵van Rijsewijk LGM, Oldenburg B, Snijders TAB, Dijkstra JK, Veenstra R. A description of classroom help networks, individual network position, and their associations with academic achievement. *PLoS One.* 2018;13:e0208173.
- ¹⁶ UNESCO. (2019). Behind the numbers: Ending school violence and bullying. Paris.
- ¹⁷Dalla Pozza, V., Di Pietro, A., Morel, S., & Psaila, E. (2016). Cyberbullying among young people. In European Parliament Think Tank. [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU\(2016\)571367_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571367/IPOL_STU(2016)571367_EN.pdf)
- ¹⁸Mascheroni, G. & Cuman, A. (2014). Net Children Go Mobile: Final report. Deliverables D6.4 & D5.2. Milano: Educat.

4. SPORT E TEMPO LIBERO

INTRODUZIONE

L'attività fisica regolare aiuta a prevenire e curare le malattie non trasmissibili come le patologie cardiache, ictus, diabete, cancro, ipertensione. Aiuta a prevenire anche l'eccesso ponderale e può contribuire a migliorare la salute mentale, la qualità della vita e il benessere degli individui¹.

Ridurre i livelli di inattività fisica è una strategia fondamentale per diminuire il carico delle malattie, come indicato nel “*Global action plan for the prevention and control of NCDs 2013-2020*”² dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS); per raggiungere questo ambizioso obiettivo è necessario prendere atto del fatto che i principali determinanti dell'inattività fisica sono associati a cambiamenti sociali e ambientali, come la tecnologia, la globalizzazione e l'urbanizzazione, che stanno trasformando il modo in cui le persone vivono, lavorano, viaggiano e si divertono, incrementando i livelli di sedentarietà³.

Le attività sedentarie, al pari dell'inattività fisica, sono riconosciute come un fattore di rischio per la salute con conseguenze gravi per il benessere in ogni momento del ciclo di vita. Il tempo trascorso in attività sedentarie, come ad esempio lo stare seduti, è associato ad un maggior rischio di morbilità e mortalità^{4,5}. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la sedentarietà sottrae tempo all'attività fisica; alcuni studi hanno, infatti, dimostrato una riduzione del rischio di mortalità quando si sostituisce il tempo impiegato in attività sedentarie con una sessione di attività fisica di pari durata⁶.

Lo stare seduti “*sitting time*” viene considerato un marker del profilo “sedentario” e comprende tutta una serie di attività quali: guardare la TV, stare al computer, stare seduti a leggere o a lavorare, ecc⁷.

Occorre, tuttavia, precisare che un comportamento sedentario è un'attività che comporta una bassa spesa energetica⁸ e non deve essere definito come il mancato raggiungimento dei livelli raccomandati di attività fisica; un individuo, infatti, può trascorrere una grande quantità di tempo in un comportamento sedentario e soddisfare comunque le linee guida per l'attività fisica da moderata a vigorosa⁹.

Promuovere uno stile di vita attivo sin dall'età evolutiva diventa indispensabile e prioritario se si vuole rallentare lo sviluppo di processi patologici a lungo termine e creare abitudini sane per tutta la vita^{10,11}.

Attualmente, il primo Piano d'azione globale per promuovere l'attività fisica - *More active people for a healthier world* – dell'OMS risponde alla richiesta dei governi di avere linee guida aggiornate sulle politiche efficaci per aumentare l'attività fisica in tutta la popolazione e, specialmente, nei gruppi più a rischio come le donne adulte e gli adolescenti¹².

In questa sezione si descrive come e quanto i giovani si muovono e quanto tempo dedicano alle attività sedentarie.

L'ATTIVITA' FISICA

Secondo l'OMS, per i giovani (5-17 anni) i livelli raccomandati di attività fisica includono il gioco, lo sport, i trasporti, la ricreazione, l'educazione fisica, nel contesto delle attività di famiglia, scuola e comunità, in modo da accumulare quotidianamente almeno 60 minuti di attività motoria moderata-intensa¹³.

La partecipazione ad attività motorie, ricreative e sportive, al contrario di televisione e computer, rappresenta, tra i comportamenti messi in atto dai ragazzi, una tra le risorse più importanti per migliorarsi, superare i propri limiti, divertirsi, costruire nuove amicizie e crescere in salute^{14,15}. La pratica sportiva consente, infatti, di attuare processi di


socializzazione, identificazione e strutturazione del carattere, migliora l'autostima ed accresce le competenze relazionali interpersonali, serve ad acquisire una ampia serie di competenze e abilità che non riguardano solo la motricità ma che sono utilissime per la vita futura¹⁶. E' infatti ampiamente dimostrato che i benefici più evidenti che derivano ad un giovane dal praticare un'attività motoria regolare si manifestano non solo nello sviluppo fisico ma anche nel comportamento sociale e nell'autonomia^{17,18}. Per rilevare il tempo dedicato all'attività fisica svolta dai ragazzi, il protocollo dello studio utilizza la domanda "negli ultimi 7 giorni, quanti giorni hai fatto attività fisica per un totale di almeno 60 minuti al giorno"; in tabella 4.1 si riportano in percentuale le risposte dei ragazzi rispettivamente per età e genere.

TABELLA 4.1 "NELL'ULTIMA SETTIMANA QUANTI GIORNI HAI FATTO ATTIVITÀ FISICA PER UN TOTALE DI ALMENO 60 MINUTI AL GIORNO?", PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
NON FACCIAMO MAI ATTIVITÀ FISICA	3,4	7,2	10,2
UN GIORNO	11,8	10,7	12,2
DUE GIORNI	17,7	14,8	16,5
TRE GIORNI	20,2	20,3	21,6
QUATTRO GIORNI	17,5	17,5	16,5
CINQUE GIORNI	10,7	11,7	9
SEI GIORNI	8,3	7,5	6,7
SETTE GIORNI	10,4	10,3	7,3

Osservando la tabella 4.1, si nota che il 3% dei ragazzi di 11 anni, il 7% dei ragazzi di 13 anni ed il 10% dei ragazzi di 15 anni non svolge mai attività fisica, mentre complessivamente circa la metà (54%) del campione, riferisce di svolgere almeno un'ora di attività fisica dai due ai quattro giorni a settimana e solo il 17% svolge attività fisica 6 o più giorni la settimana. L'attività fisica quasi tutti i giorni è svolta in prevalenza dai maschi (21% contro il 12% delle femmine) (fig. 4.1).

Figura 4.1 Frequenza di attività fisica settimanale (numero di giorni con almeno 60 minuti di attività fisica), per genere (%)



Ai ragazzi è stato anche chiesto di indicare quante volte, al di fuori dell'orario scolastico, facessero esercizio fisico intenso tale da rimanere senza fiato o sudare, per individuare le differenze con un'attività fisica moderata. In tabella 4.2 si riporta in percentuale le risposte dei ragazzi per età.

TABELLA 4.2 "FREQUENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITÀ DI ATTIVITÀ FISICA INTENSA ESERCITATA AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
OGNI GIORNO	11,3	9,6	5,9
DA 4 A 6 VOLTE A SETTIMANA	22,1	22,9	22,4
2-3 VOLTE A SETTIMANA	37,5	36,3	37,2
UNA VOLTA A SETTIMANA	15,8	16,1	15
UNA VOLTA AL MESE	3,5	3,1	5,9
MENO DI UNA VOLTA AL MESE	2,5	4,1	5,3
MAI	7,3	7,9	8,3

Osservando la tabella 4.2, si nota che il 7,8% dei ragazzi, indipendentemente dall'età, non svolge mai attività fisica; la quota più consistente di adolescenti (37%), dichiara di svolgere esercizio fisico in occasione di attività extrascolastiche tra le due e le tre volte alla settimana.

COMPORAMENTI SEDENTARI

I comportamenti sedentari, come ad esempio la visione della TV e l'uso dei device elettronici/videogiochi, sono negativamente associati con la salute e il benessere durante l'adolescenza^{19,20}. Alcuni studi evidenziano un legame tra questi comportamenti nei ragazzi e l'aumento dello stress, dell'ansia e del consumo di sostanze^{21,22,23}.

Nei bambini e negli adolescenti, esiste una forte relazione, supportata da molteplici evidenze, tra il comportamento sedentario (principalmente "screen time") e l'obesità²⁴. Alcuni studi hanno, inoltre, trovato un'associazione tra il comportamento sedentario e i livelli di pressione arteriosa e il colesterolo totale, ma anche con l'autostima, i problemi di comportamento sociale, l'idoneità fisica e il rendimento scolastico²⁴.

Gli stili di vita sedentari permeano tutti i settori della vita, inclusi il lavoro, la scuola, i trasporti, il tempo libero/svago e le attività spirituali/contemplative. L'elevata prevalenza della sedentarietà e dei suoi esiti avversi ha di fatto aggiunto un paradigma completamente nuovo al campo "dell'attività fisica", incentrato sulla sua comprensione e riduzione^{25,26}.

La sezione del questionario HBSC dedicato alla pratica di attività fisica viene arricchita da alcune domande sulla sedentarietà, ovvero quante ore al giorno vengono trascorse davanti alla televisione e davanti a computer e/o giochi elettronici. Per studiare i modelli di comportamento nella loro globalità il questionario distingue tra giorni settimanali e week-end.

FREQUENZA DELL'USO DI TELEVISIONE, COMPUTER E NUOVE FORME DI COMUNICAZIONE

L'*American Academy of Pediatrics* affida ai genitori l'importante compito di educare i propri figli ad un uso consapevole e limitato dei diversi media²⁷. I bambini e gli adolescenti di oggi vivono immersi nei media: dalla TV ai media interattivi, quali i social e i videogiochi.

L'utilizzo globale dei media tra gli adolescenti ha continuato a crescere negli ultimi dieci anni, aiutato dal recente aumento dell'uso del telefono cellulare; circa tre quarti degli adolescenti oggi possiedono uno smartphone, che consente l'accesso a Internet, streaming TV/video e "app" interattive, e circa un quarto si definisce "costantemente connesso" a Internet²⁸.

Le evidenze suggeriscono che i bambini e gli adolescenti hanno bisogno di sonno, attività fisica e tempo libero lontano dai media^{29,30}; la famiglia, ma anche i diversi contesti educativi (ad esempio la scuola), sono pertanto chiamati a svolgere un ruolo importante per educare le giovani generazioni ad un uso consapevole delle diverse tipologie di intrattenimento su schermo.

Nelle tabelle 4.3 e 4.4 viene descritta la frequenza d'uso della televisione, DVD o altre forme di intrattenimento su schermo da parte dei ragazzi durante i giorni di scuola e nel fine settimana.

TABELLA 4.3 "DI SOLITO NEL TUO TEMPO LIBERO QUANTE ORE AL GIORNO GUARDI LA TV, DEI VIDEO, DEI DVD E ALTRE FORME DI INTRATTENIMENTO SU SCHERMO?" NEI GIORNI DI SCUOLA, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MAI	8,1	5,9	5,2
CIRCA MEZZ'ORA	22,9	14,9	12,9
CIRCA UN'ORA	27,1	27,5	27,6
CIRCA 2 ORE	20,9	25,9	26
CIRCA 3 ORE	11,8	13,1	15,8
CIRCA 4 ORE	4,7	6	5,8
CIRCA 5 ORE O PIÙ	4,5	6,9	6,7

TABELLA 4.4 "DI SOLITO NEL TUO TEMPO LIBERO QUANTE ORE AL GIORNO GUARDI LA TV, DEI VIDEO, DEI DVD E ALTRE FORME DI INTRATTENIMENTO SU SCHERMO?" NEL FINE SETTIMANA, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MAI	4,3	3,3	4,8
CIRCA MEZZ'ORA	10,5	7,5	5,4
CIRCA UN'ORA	21,5	17,8	16,1
CIRCA 2 ORE	22,6	21	22,8
CIRCA 3 ORE	16,9	19	21
CIRCA 4 ORE	9,7	13	12,2
CIRCA 5 ORE O PIÙ	14,5	18.3	17,8

In generale, si osserva come durante i giorni di scuola la maggior parte dei ragazzi (rispettivamente il 79% degli undicenni il 74% dei tredicenni ed il 72% dei più grandi) passi davanti alla TV un tempo pari o inferiore alle due ore giornaliere. Durante il fine settimana aumenta la quota di ragazzi che passano più di due ore davanti a schermi (41% a 11 anni, 50% a 13 anni e 51% a 15 anni).

Nelle tabelle 4.5 e 4.6 viene descritta la frequenza d'uso di computer, console, tablet, smartphone e altri device da parte dei ragazzi durante i giorni di scuola e nel fine settimana.

TABELLA 4.5 "DI SOLITO NEL TUO TEMPO LIBERO QUANTE ORE AL GIORNO PASSI A GIOCARE AL COMPUTER, ALLA CONSOLE, SUI TABLET, SULLO SMARTPHONE O ALTRI DEVICE?" NEI GIORNI DI SCUOLA, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MAI	18,5	15,5	23,6
CIRCA MEZZ'ORA	25,6	19,5	18
CIRCA UN'ORA	24,1	23,2	21,7
CIRCA 2 ORE	15,2	19,1	18,2
CIRCA 3 ORE	8,3	9,9	8,3
CIRCA 4 ORE	3,3	5,1	4,2
CIRCA 5 ORE O PIÙ	5	7,6	6

TABELLA 4.6 "DI SOLITO NEL TUO TEMPO LIBERO QUANTE ORE AL GIORNO PASSI A GIOCARE AL COMPUTER, ALLA CONSOLE, SUI TABLET, SULLO SMARTPHONE O ALTRI DEVICE?" NEL FINE SETTIMANA, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
MAI	11,5	12,9	19,7
CIRCA MEZZ'ORA	17,6	12,6	13,9
CIRCA UN'ORA	21,5	16,9	14,3
CIRCA 2 ORE	17,2	18,7	15,8
CIRCA 3 ORE	12,8	12,7	13,4
CIRCA 4 ORE	6,9	9,4	9,6
CIRCA 5 ORE O PIÙ	12,6	16,9	13,3

La maggior parte dei giovani (rispettivamente il 83% a 11 anni, il 77% a 13 anni ed il 82% a 15 anni) dichiara di usare per un tempo pari o inferiore a 2 ore i diversi device durante i giorni di scuola; di contro, durante il fine settimana, le prevalenze sono rispettivamente 67% a 11 anni, 61% a 13 anni e 64% a 15 anni. Complessivamente si nota come gli adolescenti dedichino a questi device più tempo nel fine settimana (il 36% li usa 3 ore o più) rispetto ai giorni di scuola (il 19% li usa 3 ore o più).

In figura 4.2 e 4.3 si riportano le differenze di genere, limitatamente all'uso durante i giorni di scuola e nel fine settimana, dei device indicati.

Figura 4.2 Frequenza del tempo dedicato durante **la settimana** all'utilizzo di computer/console/tablet, per genere (%)





Figura 4.3 Frequenza del tempo dedicato durante il **fine settimana** all'utilizzo di computer/console/tablet, per genere (%)



Per quel che riguarda le differenze di genere si osserva una spiccata preferenza dei ragazzi, rispetto alle coetanee, per il tempo trascorso a giocare con i diversi device. È solo il 12,3% dei maschi a dichiarare di non utilizzarli mai in settimana, contro il 25,7% delle ragazze; nel fine settimana non li usa mai il 7,8% dei maschi contro il 20,8% delle femmine.

CONCLUSIONI

In accordo con la letteratura nazionale e internazionale, l'indagine ha evidenziato come l'attività fisica fra gli adolescenti sia piuttosto scarsa e si riduca ulteriormente con l'età e fra le ragazze. L'attività fisica quasi tutti i giorni è svolta in prevalenza dai maschi (21% contro il 12% delle femmine).

Durante la settimana, il tempo impegnato in attività sedentarie (tv, video, DVD, schermi), come da linee guida, è inferiore o pari alle due ore giornaliere per tre quarti dei ragazzi; anche il gioco su pc, console, smartphone o altri device, rimane inferiore o pari alle due ore giornaliere per 8 ragazzi su 10. Nel fine settimana però le attività sedentarie aumentano considerevolmente: passano fino a due ore al giorno davanti a schermi 5 ragazzi su 10 e giocando su device elettronici 6 ragazzi su 10.

I ragazzi amano questo tipo di attività più delle femmine: è solo il 12,3% dei maschi a dichiarare di non utilizzarli mai in settimana, contro il 25,7% delle ragazze.

Rispetto alla rilevazione precedente non si riscontrano sconstamenti importanti.

Cos'è cambiato rispetto alle rilevazioni precedenti?

	2004	2008	2014	2018
Attività fisica (almeno 60 min per 6 gg/ sett) (11 anni)	17%	16,7%	21,7%	18,7%
Attività fisica (almeno 60 min per 6 gg/ sett) (15 anni)	13,8%	16%	13,5%	14%
Attività sedentarie (tv/video/dvd/schermi) più di 2 ore/dì (11 anni)	29,5%	22,1%	21%	21%
Attività sedentarie (tv/video/dvd/schermi) più di 2 ore/dì (15 anni)	47,7%	42,1%	29%	28,3%
Attività sedentarie (computer/console,tablet/ smartphone) più di 2 ore/dì (11 anni)	4%	6,7%	14,8%	16,7%
Attività sedentarie (computer/console,tablet/ smartphone) più di 2 ore/dì (15 anni)	10,4%	12,2%	22%	18,5%

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹ Global recommendations on physical activity for health: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789241599979_eng.pdf?sequence=1
- ² Global action plan for the prevention and control of noncommunicable diseases 2013-2020: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/94384/9789241506236_eng.pdf?sequence=1
- ³ Dichiarazione di Bangkok sull'attività fisica per la salute globale e lo sviluppo sostenibile: https://www.dors.it/documentazione/testo/201704/Bkk_italian_DEF.pdf
- ⁴ Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. *Lancet*. 2016;388(10051):1302–1310
- ⁵ Keadle SK, Moore SC, Sampson JN, Xiao Q, Albanes D, Matthews CE. Causes of death associated with prolonged TV viewing: NIH-AARP Diet and Health Study. *Am J Prev Med*. 2015;49(6):811–821
- ⁶ Rees-Punia E, Evans EM, Schmidt MD, Gay JL, Matthews CE, Gapstur SM, Patel AV. Mortality Risk Reductions for Replacing Sedentary Time With Physical Activities. *Am J Prev Med*. 2019;56(5):736-741.
- ⁷ Owen N. Sedentary behavior: Understanding and influencing adults' prolonged sitting time. *Preventive Medicine* 55 (2012) 535–539)
- ⁸ Biddle S.J., Gorely T, Marshall S.J, Murdey I, Cameron N. (2004). Physical activity and sedentary behaviours in youth: issues and controversies. *The Journal of the Royal Society for the Promotion of Health*, 124:29–33
- ⁹ Pate RR, Mitchell JA, Byun W, Dowda M. Sedentary behaviour in youth. *Br J Sport Med* 2011; 45: 906–913
- ¹⁰ Rowland TW. Physical Activity, Fitness and Children. In Bouchard C, Blair SN, Haskell W. *Physical Activity and Health*. Huma Kinetics. 2007.
- ¹¹ Janssen I., Leblanc A. (2009). Systematic Review of the Health Benefits of Physical Activity in School-Aged Children and Youth. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*, 11:7-40
- ¹² More active people for a healthier world: <https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/>
- ¹³ WHO (2010). Global strategy on diet, physical activity and health: <http://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/9789241599979/en/>
- ¹⁴ Liu M, Wu L, Ming Q. How Does Physical Activity Intervention Improve Self-Esteem and Self-Concept in Children and Adolescents? Evidence from a Meta-Analysis. *PLoS One*. 2015;10(8):e0134804.
- ¹⁵ Rodriguez-Ayllon M, Cadenas-Sánchez C, Estévez-López F et al. Role of Physical Activity and Sedentary Behavior in the Mental Health of Preschoolers, Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Med*. 2019
- ¹⁶ Eime RM, Young JA, Harvey JT, et al. A systematic review of the psychological and social benefits of participation in sport for children and adolescents: informing development of a conceptual model of health through sport. *Int J Behav Nutr Phys Act* 2013;15:10-98.
- ¹⁷ EU Working Group “Sport and Health” (2008). EU Physical Activity Guidelines: <http://www.eufic.org/article/en/artid/Guidelines-physical-activity/>
- ¹⁸ Granger E, Di Nardo F, Harrison A, Patterson L, Holmes R, Verma A. A systematic review of the relationship of physical activity and health status in adolescents. *Eur J Pub Health*. 2017;27:100–6
- ¹⁹ Carson V, Hunter S, Kuzik N, Gray CE, Poitras VJ, Chaput J-P, Saunders TJ, Katzmarzyk PT, Okely AD, Connor Gorber S, et al. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth: an update. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2016;41:S240–65
- ²⁰ Tremblay, M.S., Leblanc, A.G., Janssen, I., Kho, M.E., Hicks, A., Murumets, K., et al. 2011a. Canadian sedentary behaviour guidelines for children and youth. *Appl. Physiol. Nutr. Metab*. 36(1): 59–64
- ²¹ Pengpid S, Peltzer K. Leisure-Time Sedentary Behavior Is Associated with Psychological Distress and Substance Use among School-Going Adolescents in Five Southeast Asian Countries: A Cross-Sectional Study. *Int J Environ Res Public Health*. 2019 Jun 13;16(12). pii: E2091.
- ²² Allen MS, Walter EE, Swann C. Sedentary behaviour and risk of anxiety: a systematic review and meta-analysis. *J Affect Disord*. 2019;242:5–13.
- ²³ Stanczykiewicz B, Banik A, Knoll N, Keller J, Hohl DH, Rosińczuk J, Luszczynska A. Sedentary behaviors and anxiety among children, adolescents and adults: a systematic review and meta-analysis. *BMC Public Health*. 2019 Apr 30;19(1):459
- ²⁴ de Rezende LF, Rodrigues Lopes M, Rey-López JP, Matsudo VK, Luiz Odo C. Sedentary behavior and health outcomes: an overview of systematic reviews. *PloS One*. 2014 Aug 21;9(8):e105620.
- ²⁵ Rollo S, Gaston A, Prapavessis H. Cognitive and motivational factors associated with sedentary behavior: a systematic review. *AIMS Public Health*. 2016. 10.3934/publichealth.2016.4.956.
- ²⁶ Katzmarzyk PT. Physical activity, sedentary behavior, and health: paradigm paralysis or paradigm shift? *Diabetes*. 2010;59(11):2717-25.
- ²⁷ <https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx>

²⁸ Lenhart A. Teens, Social Media & Technology Overview 2015. Washington, DC: Pew Internet and American Life Project; 2015.

²⁹ COUNCIL ON COMMUNICATIONS AND MEDIA. Media Use in School-Aged Children and Adolescents. Pediatrics. 2016 Nov;138(5)

³⁰ <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/325147/WHO-NMH-PND-2019.4-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

5. ABITUDINI ALIMENTARI E STATO NUTRIZIONALE

INTRODUZIONE

Le abitudini alimentari scorrette sono riconosciute tra i principali determinanti con implicazioni dirette sulla salute individuale^{1,2,3} e sono direttamente correlate alle alterazioni della dieta.

L'alimentazione ha, dunque, un forte impatto sulla salute nel corso di tutta la vita in quanto condiziona lo stato fisico corrente dell'individuo, ma anche la possibilità di sviluppare, nel tempo, patologie cronico degenerative come cancro, diabete, malattie cardiovascolari e obesità^{4,5,6,7}.

Mangiare sano può di fatto salvare la vita e per tale motivo occorre sin da piccoli instaurare e far conoscere corretti stili alimentari⁸. Un giovane con un sano stile di vita avrà maggiori possibilità di divenire un adulto sano il quale, a sua volta, avrà più probabilità di vivere l'età senile in buona efficienza fisica con ovvi vantaggi per i cittadini stessi e per il Sistema Sanitario.

Nei giovani, in particolare durante l'adolescenza, il processo di cambiamento o di consolidamento di comportamenti favorevoli alla salute risulta fondamentale essendo questa un'età in cui, all'esigenza di mantenere uno stato di buona salute, si aggiunge quella di favorire una crescita sana in un momento di trasformazioni fisiche ed emotive. I comportamenti alimentari degli adolescenti sono influenzati da diversi fattori correlati e la famiglia è stata segnalata come uno dei principali fattori determinanti^{9,10,11}; i genitori, infatti, possono modellare il comportamento alimentare dei loro figli fornendo alimenti sani a casa^{12,13} e incoraggiando scelte alimentari salutari¹⁴. Anche l'ambiente scolastico così come l'influenza tra pari possono condizionare le scelte alimentari di un adolescente¹⁵.

L'OMS nel 2018 ha prodotto una fact sheet ad hoc che fornisce una serie di raccomandazioni per una dieta sana in tutte le fasce della popolazione e individua una serie di azioni che sinergicamente possono portare ad un miglioramento dell'offerta alimentare¹⁶. La dieta, infatti, si evolve nel tempo ed essendo influenzata da molti determinanti sociali ed economici, necessita di interventi multisettoriali ad esempio nell'ambito della governance, dell'agricoltura e dell'industria.

Nella prima parte del capitolo vengono presentati i risultati relativi ad alcune abitudini alimentari dei ragazzi, con particolare riferimento alla colazione e alla variabilità della dieta in termini di alimenti fortemente raccomandati, quali frutta e verdura, e alimenti sconsigliati, quali dolci e bevande zuccherate¹⁷.

La seconda parte del capitolo è invece dedicata allo stato ponderale dei ragazzi; HBSC raccoglie i dati auto-riferiti su peso e statura¹⁸, tramite i quali viene calcolato l'Indice di Massa Corporea (IMC) e successivamente definito lo stato di: sottopeso, normopeso, sovrappeso e obeso utilizzando i valori soglia dell'International Obesity Task Force (IOTF) desunti da Cole et al.^{19,20}; per i confronti internazionali le curve dell'OMS²¹.

L'Indice di Massa Corporea (IMC) di bambini, adolescenti e adulti, pur rimanendo elevato, sembra aver subito in alcuni Paesi ad alto reddito un arresto della crescita (plateau); al contrario, in alcune regioni asiatiche, è in continuo aumento²². Questa fase di plateau non deve, tuttavia, distogliere l'attenzione dal problema dell'obesità, soprattutto quella dei giovani, che rappresenta un fattore di rischio per una serie di morbosità in età adulta con ripercussioni notevoli anche sulla sfera psicologica dell'individuo.

Il capitolo si chiude con un focus sull'igiene del cavo orale proprio perché sono molte le patologie legate ad una igiene non corretta stabilitesi nell'infanzia e

nell'adolescenza²³; anche in questo caso, un monitoraggio della diffusione di abitudini di igiene orale nella popolazione giovanile può indicare quali sono le esigenze educative più urgenti in termini di prevenzione. Recenti studi suggeriscono, infatti, che il consumo di alimenti e bevande zuccherate è un chiaro fattore di rischio per la salute orale, in particolare: la carie dentale e l'infiammazione gengivale sono risultate correlate ad una dieta ad alto contenuto di zuccheri mentre, l'erosione dentale e il trauma dentale sono stati più comunemente associati al consumo di bevande zuccherate ²⁴.

FREQUENZA E REGOLARITA' DEI PASTI

La colazione rappresenta un pasto estremamente importante per l'equilibrio fisiologico e psicologico, soprattutto nell'infanzia e nell'adolescenza. Saltare questo pasto influenza le capacità di concentrazione e di apprendimento, favorisce il consumo disordinato di snack / "cibi spazzatura" (junk food) e può persistere come abitudine scorretta in età adulta ^{25,26,27}.

Ai ragazzi è stato chiesto di indicare la frequenza con cui consumano la prima colazione che rappresenta uno dei pasti principali con cui garantire circa il 20% dell'introito calorico quotidiano durante i giorni di scuola e nel fine settimana.

Nella tabella 5.1 e 5.2 sono riportate rispettivamente le frequenze di consumo della colazione durante la settimana e il fine settimana.

TABELLA 5.1 "DI SOLITO QUANTE VOLTE FAI COLAZIONE (IN SETTIMANA)?", PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	18,9	26,7	25,6	23,3
UN GIORNO	3,1	3,3	3,1	3,2
DUE GIORNI	3,8	3,6	5	4
TRE GIORNI	4,6	4,7	4,9	4,7
QUATTRO GIORNI	3,6	4	3,8	3,8
CINQUE GIORNI	66,1	57,7	57,7	61,1

Più della metà dei ragazzi dichiara di fare colazione ogni giorno prima di andare a scuola, ma il consumo quotidiano diminuisce al crescere dell'età. Le percentuali riferite a un giorno/ due giorni/ tre giorni/ quattro giorni sono confrontabili sia tra le diverse categorie sia tra le varie classi di età. Alta rispetto a quanto si potrebbe desiderare è la quota di coloro che dichiarano di non fare mai colazione e la loro percentuale aumenta dopo gli 11 anni.

TABELLA 5.2 “DI SOLITO QUANTE VOLTE FAI COLAZIONE (NEL FINE SETTIMANA)?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
NON FACCIAMO MAI COLAZIONE IL FINE SETTIMANA	6,9	9,3	8,3	8,1
DI SOLITO FACCIAMO COLAZIONE UNO SOLO TRA I GIORNI DEL FINE SETTIMANA (O SABATO O DOMENICA)	13,4	15,7	18,7	15,5
DI SOLITO FACCIAMO COLAZIONE SIA IL SABATO CHE LA DOMENICA	79,7	75	73	76,4

Ben più della metà dei ragazzi dichiara di fare colazione entrambi i giorni del fine settimana, ma il consumo diminuisce comunque al crescere dell'età.

Nella tabella 5.3 sono riportate le frequenze degli spuntini che i ragazzi consumano tra i pasti per le diverse classi di età.

TABELLA 5.3 “DI SOLITO FAI UNO SPUNTINO TRA I PASTI?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
NO	10,5	9,9	9,2	10
SOLO METÀ MATTINA	12,6	12,8	13,5	12,9
SOLO NEL POMERIGGIO	29,5	30	31,5	30,1
SIA A METÀ MATTINA CHE NEL POMERIGGIO	47,3	47,2	45,9	47

Poco meno della metà dei ragazzi (47%) ha l'abitudine di consumare uno spuntino sia la mattina che il pomeriggio. Circa il 30% dei ragazzi consuma la merenda una volta al giorno, al pomeriggio. Nel complesso il 40% degli adolescenti non consuma lo spuntino di metà mattina. Non si evidenziano particolari differenze per classi di età.

Nel 2018 è stata introdotta una nuova domanda con la finalità di rilevare la frequenza del consumo dei pasti insieme in famiglia. Nella tabella 5.4 sono riportate le frequenze riferite al numero di pasti consumati insieme alla famiglia durante la settimana per le diverse classi di età.

TABELLA 5.4 “QUANTE VOLTE TU E LA TUA FAMIGLIA CONSUMATE PASTI INSIEME?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
OGNI GIORNO	54,6	54,4	52,9	54,1
LA MAGGIOR PARTE DEI GIORNI	35,3	40	40,8	38,3
CIRCA UNA VOLTA ALLA SETTIMANA	7	3,6	4,6	5,2
MENO DI UNA VOLTA ALLA SETTIMANA	2	1,1	0,6	1,4
MAI	1,1	0,9	1,1	1

Circa la metà degli adolescenti (54%) consuma pasti con la propria famiglia “Ogni giorno”; le frequenze sono simili nelle diverse classi di età. Anche per le altre categorie di consumo non si evidenziano particolari differenze.

CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA

Le linee guida nazionali e internazionali sulla sana alimentazione¹⁷ consigliano di assumere 5 porzioni al giorno di frutta e/o verdura in quanto garantiscono l’apporto di acqua, fibre, vitamine e sali minerali, importanti per una sana alimentazione. Inoltre, diverse evidenze scientifiche suggeriscono che l’elevato consumo di fibre è associato a una riduzione del rischio di sviluppare patologie croniche invalidanti (diabete, cancro, dislipidemia, ecc.)²⁸.

Ai ragazzi coinvolti nell’indagine è stato dunque chiesto di indicare la frequenza settimanale del consumo di frutta e verdura al fine di delinearne il consumo abituale


TABELLA 5.5 “DI SOLITO QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA MANGI FRUTTA?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	5	4,1	3,8	4,4
MENO DI UNA VOLTA A SETTIMANA	5,1	5,1	5,7	5,2
UNA VOLTA A SETTIMANA	9,6	10,7	10,7	10,2
TRA 2 E 4 GIORNI A SETTIMANA	23,5	27,6	27,8	26
TRA 5 E 6 GIORNI A SETTIMANA	13	15	15,1	14,2
UNA VOLTA AL GIORNO TUTTI I GIORNI	22,2	19,4	19,2	20,5
PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO	21,6	18,2	17,7	19,5

Complessivamente il consumo di frutta con frequenza maggiore si evidenzia per le categorie “Tra 2 e 4 giorni a settimana”, “Una volta al giorno tutti i giorni” e “Più di una volta al giorno”. In generale non si evidenziano sostanziali differenze tra le classi di età; solo fra quanti la consumano almeno una volta al giorno si nota una percentuale inferiore di ragazzi più grandi (44% degli undicenni, 38% dei tredicenni, 37% dei quindicenni).

Nella figura 5.1 sono riportate le frequenze percentuali del consumo di frutta su base settimanale distinte per maschi e femmine.

Figura 5.1 Frequenza del consumo di frutta, per genere (%)



Per quanto riguarda le differenze di genere, i consumi di frutta sono sostanzialmente sovrapponibili, con una percentuale lievemente maggiore di femmine che consumano frutta almeno una volta al giorno (il 42% delle femmine contro il 37% dei maschi).


TABELLA 5.6 “DI SOLITO QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA MANGI VERDURA?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	7,4	5,3	3,8	5,8
MENO DI UNA VOLTA A SETTIMANA	6,8	4,1	3,6	5,1
UNA VOLTA A SETTIMANA	7,4	8,9	6,7	7,8
TRA 2 E 4 GIORNI A SETTIMANA	24,2	24,9	27,3	25,2
TRA 5 E 6 GIORNI A SETTIMANA	15,4	18,8	19	17,4
UNA VOLTA AL GIORNO TUTTI I GIORNI	18,8	19,2	20,3	19,3
PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO	20	18,9	19,4	19,5

Complessivamente il consumo di verdura con frequenza maggiore si evidenzia per le categorie “Tra 2 e 4 giorni a settimana” con una percentuale maggiore di quindicenni.

Nella figura 5.2 sono riportate le frequenze percentuali di consumo di verdura su base settimanale distinte per maschi e femmine.

Figura 5.2 Frequenza del consumo di verdura, per genere (%)



Per quanto riguarda le differenze di genere, si evidenzia una prevalenza delle ragazze fra quanti consumano verdura almeno una volta al giorno (44% delle femmine contro il 34% dei maschi).

CONSUMO DI DOLCI E BEVANDE GASSATE

L'assunzione di grassi e zuccheri in eccesso è un'abitudine sempre più diffusa, in buona parte dovuta al consumo di prodotti dell'industria alimentare che contengono quantità notevoli di tali nutrienti ^{29,30}.

Nelle tabelle 5.7 e 5.8 sono riportate per le diverse fasce di età le frequenze settimanali del consumo di dolci, caramelle o cioccolato, cola o altre bibite con zucchero.

TABELLA 5.7 "DI SOLITO QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA MANGI DOLCI, CARMELLE O CIOCCOLATO?", PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	4,1	3,1	3,2	3,5
MENO DI UNA VOLTA A SETTIMANA	12,1	8,5	7,9	9,8
UNA VOLTA A SETTIMANA	15,2	10,6	11,3	12,6
TRA 2 E 4 GIORNI A SETTIMANA	29,5	29,3	29,7	29,5
TRA 5 E 6 GIORNI A SETTIMANA	12,6	19	18,4	16,2
UNA VOLTA AL GIORNO TUTTI I GIORNI	13,8	17,1	16,6	15,6
PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO	12,8	12,5	13	12,7

TABELLA 5.8 “DI SOLITO QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA BEVI COLA O ALTRE BIBITE CON ZUCCHERO?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	12,5	11,8	14	12,6
MENO DI UNA VOLTA A SETTIMANA	28	23,6	20,4	24,6
UNA VOLTA A SETTIMANA	24,4	22,5	23,5	23,5
TRA 2 E 4 GIORNI A SETTIMANA	16,1	23,3	24	20,5
TRA 5 E 6 GIORNI A SETTIMANA	6,9	6,6	7,7	7
UNA VOLTA AL GIORNO TUTTI I GIORNI	4,8	5,4	3,9	4,8
PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO	7,2	6,9	6,6	7

Il consumo almeno una volta al giorno di dolci (28,6%) risulta maggiore rispetto al consumo di bevande con zucchero (11,6%). Per quanto riguarda le classi di età, generalmente i consumi risultano sovrapponibili, eccetto per quanti consumano dolci almeno 5 giorni a settimana, fra i quali i ragazzi più piccoli sono in prevalenza minore (39,1% degli undicenni, 48,5% dei tredicenni, 48% dei quindicenni) e per quanti hanno un consumo moderato di bibite, tra 2 e 4 giorni a settimana, fra i quali si rileva un incremento con l'età.

Nella tabella 5.9 sono riportate per le diverse fasce di età le frequenze settimanali del consumo di legumi.

TABELLA 5.9 “DI SOLITO QUANTE VOLTE ALLA SETTIMANA MANGI LEGUMI?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	16,7	11,2	9,3	13
MENO DI UNA VOLTA A SETTIMANA	17,5	17,6	19	17,9
UNA VOLTA A SETTIMANA	20,4	24,3	24,5	22,8
TRA 2 E 4 GIORNI A SETTIMANA	24,4	26,7	28,4	26,1
TRA 5 E 6 GIORNI A SETTIMANA	10,4	12,8	10,5	11,3
UNA VOLTA AL GIORNO TUTTI I GIORNI	5,9	4,5	6,2	5,5
PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO	4,8	2,9	2,1	3,5

Circa un quarto (26%) dei ragazzi mangia i legumi tra 2 e 4 giorni a settimana, mentre circa 1 ragazzo su 10 dichiara di non assumerli mai, con una prevalenza degli undicenni (17%) rispetto a tredicenni (11%) e quindicenni (9%).

In tabella 5.10 si riporta la frequenza di consumo quotidiana di alcuni alimenti suddivisa per età e genere

TABELLA 5.10 FREQUENZE DI “CONSUMO ALMENO UNA VOLTA AL GIORNO TUTTI I GIORNI” CON INDICATORI SINTETICI, PER ETÀ E GENERE (%)

	11 anni (%)		13 anni (%)		15 anni (%)	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
FRUTTA	42	45,7	35,5	39,9	34	40,4
VERDURA	34,5	43,4	32,4	44,4	35,3	44,7
DOLCI	25,4	27,7	27,7	31,5	29,5	29,7
COLA O ALTRE BIBITE ZUCCHERATE/ GASSATE	14,2	9,7	13,6	10,7	13,2	7,3
SNACK SALATI	13,8	18,1	13,5	20,7	12,7	14,9
CEREALI (COME CORN FLAKES, MUESLI, ECC.)	17,4	18,3	15,6	13,8	17,2	12,5
CEREALI (PANE, PASTA, RISO)	52,6	53,4	61,4	61,5	69	57,8
LEGUMI	10,7	10,5	7,5	7,4	8,4	8,2

Non si riscontrano sostanziali differenze di genere nel consumo dei diversi alimenti se non per il consumo di verdura: le ragazze che consumano verdura almeno una volta al giorno sono circa il 44% contro il 34% dei ragazzi.

Per quanto riguarda le differenze per età, si riscontra fra i maschi un calo nel consumo di frutta all'avanzare dell'età (42% degli undicenni contro il 34% dei quindicenni) e un aumento di quanti consumano cereali almeno una volta al giorno, (52% dei ragazzi di 11 anni, 61% di 13 anni e 69% di 15 anni).

STATO NUTRIZIONALE

È stato chiesto ai ragazzi di dichiarare il proprio peso e altezza, così da poter calcolare l'Indice di Massa Corporea ($IMC = \text{kg}/\text{m}^2$) e classificare i ragazzi in sottopeso, normopeso, sovrappeso e obesi. Tale classificazione è stata operata secondo le tavole di Cole¹⁹⁻²⁰ in modo separato per età e sesso.

Nella tabella 5.11 sono riportate le frequenze riferite alle classi di età 11, 13 e 15 anni. La figura 5.4 evidenzia le distribuzioni percentuali del campione in relazione alla classe di IMC distinte per età (11, 13 e 15 anni) e per genere.


TABELLA 5.11 VALUTAZIONE DEL PESO IN BASE AL IMC (CALCOLATO SU PESO E ALTEZZA DICHIARATI), PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
SOTTOPESO	4	2,9	2,3	3,2
NORMOPESO	79,6	81,8	82,7	81,2
SOVRAPPESO	13,6	13,3	12,7	13,3
OBESO	2,8	2	2,4	2,4

La maggior parte dei ragazzi risulta essere normopeso (81%), i ragazzi sottopeso sono il 3%, i sovrappeso sono il 13% e gli obesi sono il 2%, senza differenze sostanziali per età.

Sono notevoli, invece, le differenze di genere: a tutte le età i maschi sovrappeso e obesi sono quasi il doppio delle femmine (fig. 5.4)

Figura 5.4 Frequenza di sovrappeso e obesità per genere ed età (%)



INSODDISFAZIONE CORPOREA

Gli adolescenti spesso riportano dei sentimenti d'insoddisfazione corporea, intesa come un sentimento di scontentezza per forma, peso, altezza o altri aspetti del corpo; causato da una distorsione percettiva/affettiva o da dati oggettivi ³¹. Tale insoddisfazione riguarda principalmente il proprio peso e il percepirsi "troppo grasse/i", indipendentemente dal fatto di essere oggettivamente sovrappeso o meno. Ai ragazzi è stato chiesto di pensare al proprio corpo e di riportare come si vedono tra le seguenti opzioni: (i) decisamente troppo magro, (ii) un po' troppo magro, (iii) più o meno della taglia giusta, (iv) un po' troppo grasso, (v) decisamente troppo grasso. Le risposte decisamente troppo grasso e un po' troppo grasso possono essere aggregate per descrivere il percepire di essere in sovrappeso ³².

Nella tabella 5.12 sono riportate le frequenze riferite alla percezione del proprio corpo per le classi di età 11, 13 e 15 anni.


TABELLA 5.12 “PENSI CHE IL TUO CORPO SIA...”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
DECISAMENTE TROPPO MAGRO	2,2	1,4	1,7	1,8
UN PO' TROPPO MAGRO	12,2	11,9	12,2	12,1
PIÙ O MENO DELLA TAGLIA GIUSTA	65,4	59,9	59,7	62,1
UN PO' TROPPO GRASSO	18,5	24	24,1	21,8
DECISAMENTE TROPPO GRASSO	1,6	2,8	2,3	2,2

In generale più della metà degli adolescenti (62,1%) si percepisce “più o meno della taglia giusta”. Circa un quarto (24,5%) si percepisce “un po’ troppo grasso” o “decisamente troppo grasso”. Questa percezione è meno rilevante fra i ragazzi più giovani (20,2% degli undicenni, 24,8% dei tredicenni, 24,4% dei quindicenni).

Nella figura 5.5 è evidenziata la percentuale dei ragazzi di 11, 13 e 15 anni che si percepisce in sovrappeso (“un po’ troppo grasso” e “decisamente troppo grasso”) distinta per genere.

Figura 5.5 Frequenza di coloro che si sentono grassi o molto grassi, per età e genere (%)



All’aumentare dell’età aumenta la quota delle ragazze che si percepiscono “grasse o molto grasse”, tale convinzione è decisamente maggiore nelle femmine rispetto ai maschi, a tutte le età.

Nella tabella 5.13 sono riportate le frequenze dei ragazzi che si percepiscono “un po’ troppo grasso” e “decisamente troppo grasso” in relazione al proprio IMC (dichiarato), per classe di età.

TABELLA 5.13 FREQUENZA DI RAGAZZI CHE SI PERCEPISCONO GRASSI O MOLTO GRASSI RISPETTO AL PROPRIO IMC, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
SOTTOPESO	2,9	7,1	0	3,7%
NORMOPESO	14,6	20	19,8	18,3%
SOVRAPPESO	48,2	61,3	60,4	56,7%
OBESO	58,3	78,9	71,4	73,3%

La maggior parte dei ragazzi sovrappeso (56,7%) e obesi (73,3%) si percepisce “un po’ troppo grasso” o “decisamente troppo grasso” (59,2%). Tuttavia anche una percentuale non trascurabile (18,3%) di ragazzi normopeso/ sottopeso si considera troppo grasso; tale fenomeno è meno marcato negli undicenni.

Ai ragazzi è stato anche chiesto se nel periodo in cui hanno compilato il questionario fossero a dieta; in tabella 5.14 è possibile consultare quanto dichiarato dai ragazzi.

TABELLA 5.14 “IN QUESTO PERIODO SEI A DIETA O STAI FACENDO QUALCOSA PER DIMAGRIRE?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
NO, IL MIO PESO È' QUELLO GIUSTO	52,8	43,7	41,4	46,9
NO, MA DOVREI PERDERE QUALCHE CHILO	18,8	23	25,6	21,9
NO, PERCHÉ DOVREI METTERE SU QUALCHE CHILO	12	12,5	14,3	12,8
SÌ	16,4	20,7	18,6	18,4

In generale il 47% dei ragazzi dichiara di non essere a dieta in quanto considera il proprio peso giusto. Il 22% non è a dieta ma ritiene di dover perdere qualche chilo. Il 18% dei ragazzi è a dieta. La maggior differenza per età si riscontra fra quanti ritengono di essere del peso giusto; all’aumentare dell’età la percentuale di ragazzi soddisfatti del proprio peso si riduce (53% degli undicenni contro 41% dei quindicenni).

IGIENE ORALE

L'abitudine di lavarsi i denti è essenziale per la prevenzione della carie dentale, la più diffusa delle patologie del cavo orale nei paesi industrializzati. In tabella 5.15 si evidenzia quanto riportato dai ragazzi.

TABELLA 5.15 “QUANTE VOLTE AL GIORNO TI LAVI I DENTI?”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
PIÙ DI UNA VOLTA AL GIORNO	70,6	76,3	76,7	74,1
UNA VOLTA AL GIORNO	25,6	20,3	19,9	22,4
ALMENO UNA VOLTA ALLA SETTIMANA MA NON TUTTI I GIORNI	3	2,8	1,9	2,7
MENO DI UNA VOLTA ALLA SETTIMANA	0,5	0,4	0,6	0,5
MAI	0,3	0,2	0,8	0,4

La quasi totalità degli adolescenti si lava i denti almeno una volta al giorno.

CONCLUSIONI

Sei adolescenti su 10 consumano la prima colazione regolarmente nei giorni di scuola, senza sostanziali variazioni dalle rilevazioni precedenti.

Il consumo di frutta e verdura da parte degli adolescenti resta un'abitudine poco diffusa: circa 4 adolescenti su 10 consumano frutta almeno una volta al giorno e solo 2 su 10 più di una volta al giorno. Dati pressochè sovrapponibili anche per l'abitudine a mangiare la verdura, che però registra un miglioramento dalle rilevazioni precedenti. Sebbene si sia molto ridotto dalla rilevazione del 2004, il consumo di dolci e bevande zuccherate continua ad essere rilevante: quasi un terzo dei ragazzi dichiara un consumo almeno quotidiano di dolci e il 12% di bevande zuccherate.

Per quanto riguarda l'indice di massa corporea, la percentuale di adolescenti sovrappeso ed obesi, calcolata sulle dichiarazioni di altezza e peso dei ragazzi, si situa intorno al 16%, senza grandi scostamenti per fasce d'età. Mentre per gli undicenni non si sono registrate variazioni dalla rilevazione precedente, per i quindicenni si nota un deciso aumento, a livelli pari al 2004. I ragazzi sovrappeso e obesi sono quasi il doppio delle ragazze in tutte le fasce d'età.

È diffusa l'insoddisfazione corporea soprattutto fra le ragazze più grandi: il 35% delle quindicenni ha la percezione di essere grassa o troppo grassa, nonostante la percentuale di sovrappeso/ obesi sia inferiore fra le femmine rispetto ai maschi.

Nonostante 8 ragazzi su 10 siano normopeso, 4 su 10 dichiarano di essere a dieta o che dovrebbero perdere qualche chilo. La percentuale di quanti non sono a dieta e ritengono di essere del peso giusto si riduce con l'età (53% a 11 anni contro 41% a 15 anni).

Per quanto riguarda l'igiene orale, il 96,5% dei ragazzi dichiara di lavarsi i denti almeno una volta al giorno.

Cos'è cambiato rispetto alle rilevazioni precedenti?

	2004	2008	2014	2018
Colazione 5 giorni a settimana (11 anni)	67,5%	72,4%	65,3%	66,1%
Colazione 5 giorni a settimana (15 anni)	55,2%	55,4%	56,4%	57,7%
Consumo di frutta almeno una volta al giorno (11 anni)	43,4%	49,7%	46,2%	43,8%
Consumo di frutta almeno una volta al giorno (15 anni)	42,2%	46,2%	39%	36,9%
Consumo di verdura almeno una volta al giorno (11 anni)	31,9%	36,2%	35,9%	38,8%
Consumo di verdura almeno una volta al giorno (15 anni)	35,6%	37,4%	41,3%	39,7%
Dolci almeno una volta al giorno (11 anni)	34,3%	28,9%	25%	26,5%
Dolci almeno una volta al giorno (15 anni)	42%	35,6%	28%	29,6%
Bibite almeno una volta al giorno (11 anni)	19%	14,8%	14,5%	12%
Bibite almeno una volta al giorno (15 anni)	20,1%	19%	14,2%	10,5%
sovrappeso/ obesi (11 anni)	29,3%	29,8%	17%	16,4%
sovrappeso/ obesi (15 anni)	19%	14,8%	9,3%	15%
si sentono grassi (11 anni)	27,9%	24,7%	21%	20,2%
si sentono grassi (15 anni)	30%	25%	25,6%	26,4%
a dieta o pensano che dovrebbero (11 anni)	41,8%	40,7%	41,4%	35,1%
a dieta o pensano che dovrebbero (15 anni)	49,7%	44,9%	43,5%	44,2%
si lavano i denti almeno una volta al giorno (11 anni)	93,8%	95%	96,5%	96,2%
si lavano i denti almeno una volta al giorno (15 anni)	99%	98%	97,5%	96,6%

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹ World Health Organization. European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2014;
- ² Willett WC, Stampfer MJ. Current evidence on healthy eating. *Annu Rev Public Health* 2013; 34: 77–95
- ³ Micha R, Shulkin ML, Peñalvo JL, et al. Etiologic effects and optimal intakes of foods and nutrients for risk of cardiovascular diseases and diabetes: systematic reviews and meta-analyses from the Nutrition and Chronic Diseases Expert Group (NutriCoDE). *PLoS One* 2017; 12: e0175149
- ⁴ World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Diet, nutrition, physical activity and cancer: a global perspective. Continuous Update Project Expert Report, 2018. <https://www.wcrf.org/dietandcancer> (accessed Feb 19, 2019)
- ⁵ Katz DL, Meller S. Can we say what diet is best for health? *Annu Rev Public Health*. 2014;35:83-103
- ⁶ Das JK, Salam RA, Thornburg KL, Prentice AM, Campisi S, Lassi ZS, Koletzko B, Bhutta ZA. Nutrition in adolescents: physiology, metabolism, and nutritional needs. *Ann N Y Acad Sci*. 2017 Apr;1393(1):21-33
- ⁷ Centers for Disease Control and Prevention (2011). Morbidity and Mortality Weekly Report. <http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6005.pdf>.
- ⁸ GBD 2017 Diet Collaborators. Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *Lancet*. 2019 May 11;393(10184):1958-1972.
- ⁹ Watts A.W., Loth K., Berge J.M., Larson N., Neumark-Sztainer D. No Time for Family Meals? Parenting Practices Associated with Adolescent Fruit and Vegetable Intake When Family Meals Are Not an Option. *J. Acad. Nutr. Diet*. 2017;117:707–714.
- ¹⁰ Salvy S.J., Miles J.N., Shih R.A., Tucker J.S., D’Amico E.J. Neighborhood, family and peer-level predictors of obesity-related health behaviors among young adolescents. *J. Pediatr. Psychol.*
- ¹¹ Ferris K.A., Babskie E., Metzger A. Associations between Food-Related Parenting Behaviors and Adolescents’ Engagement in Unhealthy Eating Behaviors: The Role of Nutrition Knowledge. *Int. J. Aging Hum. Dev*. 2017;84:231–246.
- ¹² Loth K.A., MacLehose R.F., Larson N., Berge J.M., Neumark-Sztainer D. Food availability, modeling and restriction: How are these different aspects of the family eating environment related to adolescent dietary intake? *Appetite*. 2016;96:80–86
- ¹³ Hebestreit A., Intemann T., Siani A., De Henauw S., Eiben G., Kourides Y.A., Kovacs E., Moreno L.A., Vedidebaum T., Krogh V., et al. On behalf of the I. Family Consortium. Dietary Patterns of European Children and Their Parents in Association with Family Food Environment: Results from the I. Nutrients. 2017;9:126.
- ¹⁴ Hebestreit A., Intemann T., Siani A., De Henauw S., Eiben G., Kourides Y.A., Kovacs E., Moreno L.A., Vedidebaum T., Krogh V., et al. On behalf of the I. Family Consortium. Dietary Patterns of European Children and Their Parents in Association with Family Food Environment: Results from the I. Nutrients. 2017;9:126.
- ¹⁵ Salvy S.J., Howard M., Read M., Mele E. (2009). The presence of friends increases food intake in youth. *American Journal of Clinical Nutrition*, 90:282-7.
- ¹⁶ https://www.who.int/nutrition/publications/nutrientrequirements/healthy_diet_fact_sheet_394.pdf?ua=1
- ¹⁷ Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione - INRAN. Linee guida per una sana alimentazione italiana (http://nut.entecra.it/648/linee_guida.html).
- ¹⁸ Currie C., Samdal O., Boyce W., eds (2001). *Health Behaviour in School-aged Children: a World Health Organization cross-national study (HBSC). Research protocol for the 2001/2002 survey*. Edinburgh, Child and Adolescent Health Research Unit, University of Edinburgh.
- ¹⁹ Cole JT, Bellizzi MC, Flegal KM, et al. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: International survey. *BMJ* 2000;320:1240-5.
- ²⁰ Cole TJ, Flegal KM, Nicholls D, et al. Body mass index cut offs to define thinness in children and adolescents: international survey. *BMJ* 2007;335(7612):194.
- ²¹ World Health Organization. Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO Expert Committee. (WHO Technical Report Series; 854). Geneva: WHO; 1995.
- ²² NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128 · 9 million children, adolescents, and adults. *Lancet* 2017; 390(10113):2627-42.
- ²³ Asawa K, Sen N, Bhat N, Tak M, Sultane P, Patil V. Association of sugary foods and drinks consumption with behavioral risk and oral health status of 12- and 15-year-old Indian school children. *J Educ Health Promot*. 2018;7:19.
- ²⁴ Hoyland A., Dye L., Lawton C.L. (2009). A systematic review of the effect of breakfast on the cognitive performance of children and adolescents. *Nutrition Research Reviews*, 22:220-43.

-
- ²⁵ Kant A.K., Andon M.B., Angelopoulos T.J., Rippe J.M.(2008). Association of breakfast energy density with diet quality and body mass index in American adults: National Health and Nutrition Examination Surveys. *American Journal of Clinical Nutrition*, 5:1396-404.
- ²⁶ Hallström L, Labayen I, Ruiz JR, et al. Breakfast consumption and CVD risk factors in European adolescents: the HELENA (Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence) Study. *Public Health Nutr* 2013;16(7):1296-305.
- ²⁷ Lazzeri G, Pammolli A, Azzolini E, et al. Association between fruits and vegetables intake and frequency of breakfast and snacks consumption: a cross-sectional study. *Nutr J* 2013;12:123.
- ²⁸ Veronese N, Solmi M, Caruso MG, Giannelli G, Osella AR, Evangelou E, Maggi S, Fontana L, Stubbs B, Tzoulaki I. Dietary fiber and health outcomes: an umbrella review of systematic reviews and meta-analyses. *Am J Clin Nutr*. 2018 Mar 1;107(3):436-444.
- ²⁹ Malik V.S., Popkin B.M., Bray G.A., Despres J.P., Willett W.C., Hu F.B.(2010). Sugar-sweetened beverages and risk of metabolic syndrome and type 2 diabetes: a meta-analysis. *Diabetes Care*, 33:2477–83.
- ³⁰ Vartanian L.R., Schwartz M.B., Brownell K.D. (2007) Effects of soft drink consumption on nutrition and health: a systematic review and meta-analysis. *American Journal of Public Health*,97:667–75.
- ³¹ Palmonari A. (a cura di) (2011), *Psicologia dell'adolescenza*, Il Mulino, Bologna.
- ³² Whitehead, R., Berg, C., Cosma, A., Gobina, I., Keane, E., Neville, F., & Kelly, C. (2017). Trends in adolescent overweight perception and its association with psychosomatic health 2002–2014: evidence from 33 countries. *Journal of Adolescent Health*, 60(2), 204-211.

6. COMPORTAMENTI DI DIPENDENZA

INTRODUZIONE

Questo capitolo affronta una delle tematiche maggiormente discusse in tema di promozione della salute in preadolescenza e adolescenza: i comportamenti a rischio. In questo periodo della vita, infatti, le relazioni sociali subiscono cambiamenti radicali, i pari acquisiscono sempre maggiore importanza e aumenta la probabilità di sperimentare e adottare comportamenti che possono avere conseguenze sulla salute. Fra questi l'uso di sostanze lecite, come il tabacco e l'alcol, o illecite quali la cannabis o altre sostanze psicoattive. Nell'ultima indagine, inoltre, sono stati inseriti, per i soli quindicenni, quesiti volti ad indagare le loro esperienze col gioco d'azzardo, riconosciuto oramai come un'altra importante tematica da affrontare in ambito di sanità pubblica, anche fra i più giovani.

USO DI SOSTANZE

L'iniziazione dei giovani al fumo di tabacco e all'utilizzo di altre sostanze avviene per lo più in epoca adolescenziale e nell'ambito del gruppo che, a questa età, acquisisce sempre maggiore importanza. Ci sono diverse ragioni per cui gli adolescenti decidono di utilizzare sostanze psicotrope incluso il desiderio di provare nuove esperienze, il tentativo di affrontare problemi o di essere socialmente più accettati, o semplicemente rispondere alla pressione dei pari. I preadolescenti e gli adolescenti sono considerati "biologicamente programmati" per la ricerca di nuove esperienze e per l'adozione di comportamenti così come sono impegnati nella costruzione della loro identità. Provare droghe, siano esse legali o illegali, può soddisfare queste normali esigenze ma in modo non salutare con possibili ripercussioni nella loro vita futura¹. Da questo punto di vista, la fascia d'età dei teen-agers è considerata una finestra temporale particolarmente vulnerabile all'uso di sostanze a causa del fatto che il cervello si trova ancora in una fase di sviluppo e malleabilità (chiamata neuro plasticità) in cui alcune aree sono più mature di altre. La parte del cervello che processa il rinforzo ed il dolore, cruciali nell'assunzione di sostanze, matura prima della corteccia prefrontale responsabile del controllo delle emozioni e degli impulsi oltre che della presa di decisioni².

In linea generale bisogna considerare che non c'è un unico fattore responsabile dell'uso delle sostanze psicoattive, ma una serie di fattori che interagiscono fra di loro. Sono infatti vari i fattori che possono influenzare l'assunzione di sostanze durante l'adolescenza inclusa la loro disponibilità nella comunità di residenza o nella scuola, o l'utilizzo da parte dei propri amici. Anche la famiglia sembra rivestire un ruolo importante: violenza, abuso, malattie psichiatriche e uso da parte dei genitori incrementano la probabilità di utilizzo da parte dei figli³⁻⁴. Infine, esistono delle vulnerabilità ereditarie che spesso si combinano con caratteristiche di personalità (es. impulsività o sensation seeking) o a condizioni come depressione, ansia e Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) che possono rendere più probabile l'uso di sostanze durante la fase adolescenziale⁵. I fenomeni di abuso, riconosciuti fra i comportamenti a rischio tipici dell'adolescenza, hanno sulla salute un impatto ampiamente documentato: da quelli immediati come la mortalità per incidenti a quelli a distanza nel tempo come le patologie tumorali. Fra i problemi correlati all'utilizzo di sostanze occorre però considerare anche quelli non sanitari: disordini familiari e sociali e problemi di ordine economico non solo individuali.

In accordo con il "Global burden of disease, injuries and risk factors study"- 2013⁶⁻⁷, l'uso di alcol e tabacco e secondariamente l'uso di sostanze illegali sono i principali

fattori di rischio per morti premature e morbidità, espressa in termini di anni di vita adattati alla disabilità (disability-adjusted life years, DALYs). La riduzione del consumo di sostanze è quindi, per l'OMS, fra gli obiettivi prioritari nel XXI secolo in tema di promozione della salute.

FUMO

Nonostante siano da tempo ben note le conseguenze negative sulla salute sia a lungo, che a medio e breve termine, il consumo di tabacco rimane la principale causa di morte prevenibile, con costi enormi dovuti alle patologie ad essa correlate, se si tiene conto sia dei costi per i trattamenti che quelli legati alla perdita di produttività dovuta alle morti premature⁸. Dal momento che questo comportamento si instaura per lo più durante l'adolescenza, la valutazione della diffusione del fenomeno rappresenta un processo indispensabile per riuscire a definire politiche efficaci di salute pubblica volte sia a promuovere una cessazione precoce che, soprattutto per i più giovani, a prevenire l'inizio e l'instaurarsi della dipendenza⁹, in linea anche con quanto indicato a livello internazionale dalla Convenzione Quadro dell'OMS sul controllo del tabacco¹⁰ che stabilisce obiettivi e principi a cui i governi devono adeguarsi.

Tali interventi risultano particolarmente complessi fra i giovani che, nonostante le conseguenze negative note legate al fumo, attribuiscono all'uso di tabacco una funzione sia tipo "regolatoria" del corpo come il controllo dell'umore o del peso, ma anche di tipo relazionale come l'appartenenza al gruppo o la sensazione di maturità e indipendenza¹¹⁻¹². A riguardo già da diversi anni, poiché è stata dimostrata l'inefficacia di interventi basati solo sulla trasmissione di informazioni, si stanno sviluppando programmi finalizzati a sviluppare e rafforzare le competenze dei giovani per fare fronte alle pressioni sociali¹³.

Nelle tabelle 6.1 e 6.2 viene descritta la quota di ragazzi che ha fumato almeno una sigaretta nella propria vita e negli ultimi 30 giorni.

TABELLA 6.1 FREQUENZA DEL FUMO DI SIGARETTA, ALMENO UNA SIGARETTA NELLA VITA, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	96,9	77,3	55	80,1
1-2 GIORNI	1,9	9,9	12	7,1
3-5 GIORNI	0,2	3,1	5,5	2,5
6-9 GIORNI	0,2	1,3	3,7	1,4
10-19 GIORNI	0,3	1,7	4,3	1,8
20-29 GIORNI	0	0,7	2,5	0,8
30 GIORNI O PIÙ'	0,5	6,1	16,9	6,3

TABELLA 6.2 FREQUENZA DEL FUMO DI SIGARETTA, ALMENO UNA SIGARETTA NEGLI ULTIMI 30 GIORNI, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	99,1	88,5	72,1	89
1-2 GIORNI	0,4	4,8	7,9	3,7
3-5 GIORNI	0,1	1,7	3,8	1,5
6-9 GIORNI	0,1	1,2	2,5	1,1
10-19 GIORNI	0	1,1	2,8	1,1
20-29 GIORNI	0,1	1,2	2,7	1,1
30 GIORNI O PIÙ'	0,2	1,4	8,2	2,5

Si osserva che la maggior parte dei ragazzi intervistati ha dichiarato di non aver mai fumato nella vita; la percentuale di chi non ha mai sperimentato il fumo si riduce, però, con l'aumentare dell'età, passando dal 97% degli undicenni al 77% dei tredicenni sino al 55% dei quindicenni.

Facendo riferimento agli ultimi 30 giorni, la quota di chi non ha mai sperimentato il fumo di sigaretta cresce ulteriormente. Anche in questo caso è più elevata nei ragazzi più giovani (99% undicenni, 88,5% tredicenni e 72% quindicenni).

In tabella 6.3 si può capire la differenza di genere e di età per quanto riguarda la quota di ragazzi che dichiarano di fumare ogni giorno negli ultimi 30 giorni.

TABELLA 6.3 FREQUENZA DEL FUMO DI SIGARETTA, OGNI GIORNO NEGLI ULTIMI 30 GIORNI, PER GENERE ED ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MASCHI	0,2	1,6	7,3	2,4
FEMMINE	0,2	1,2	9,2	2,6

ALCOL

Nonostante esista un trend secolare di riduzione del consumo di alcolici¹⁴ ed un aumento del numero di astinenti tra i quindicenni¹⁵, il consumo e l'abuso di alcol fra gli adolescenti è un fenomeno che non può essere sottovalutato anche perché è in questa età che si stabiliscono i modelli di consumo che saranno poi verosimilmente mantenuti nell'età adulta. Sembra infatti esistere un legame tra l'iniziazione in giovane età e l'abuso in età adulta¹⁶. Altri autori considerano invece il consumo di alcol da parte dei giovani una fase del percorso culturale dell'adolescenza, senza che questo diventi necessariamente un problema in grado di segnarli in età adulta¹⁷.

Una considerazione da fare è che poiché l'OMS raccomanda la totale astensione dal consumo di alcol fino ai 15 anni e in Italia vige il divieto (Legge 8.11.2012 n.189) di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni, il consumo anche di una sola bevanda alcolica da parte di ragazzi minorenni rappresenta un comportamento a rischio nel consumo di alcol. Sebbene l'uso di alcolici sia recentemente diminuito in molti paesi, rimane la sostanza maggiormente utilizzata dai giovani dopo la scuola primaria, rendendo utile monitorarne i consumi, identificare i fattori ad essi associati e stabilire politiche utili a limitarli¹⁸.

Naturalmente tali politiche devono tener conto anche dei cambiamenti che negli ultimi anni si stanno osservando sul consumo di bevande alcoliche. Nel nostro Paese infatti a fronte di una riduzione del consumo di vino durante i pasti, si registra un progressivo aumento di consumo di bevande alcoliche occasionale e al di fuori dei pasti.

Nelle tabelle 6.4 e 6.5 viene descritta la quota di ragazzi che ha bevuto alcol nella propria vita e negli ultimi 30 giorni.

TABELLA 6.4 FREQUENZA DEL CONSUMO DI ALCOL NELLA VITA, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	83,6	55,3	27,6	60,4
1-2 GIORNI	9,3	19,2	16,5	14,5
3-5 GIORNI	2,8	7,1	11,2	6,3
6-9 GIORNI	0,6	5,2	12,1	4,9
10-19 GIORNI	1,4	4,1	11,1	4,7
20-29 GIORNI	0,7	2,5	7,2	2,9
30 GIORNI O PIÙ'	1,5	6,6	14,2	6,3

TABELLA 6.5 FREQUENZA DEL CONSUMO DI ALCOL NEGLI ULTIMI 30 GIORNI, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MAI	92,7	73,6	48,3	75,5
1-2 GIORNI	5,9	16,1	28,1	14,8
3-5 GIORNI	0,5	5,44	11,3	4,8
6-9 GIORNI	0,2	1,9	7,4	2,5
10-19 GIORNI	0,3	1,3	3,3	1,4
20-29 GIORNI	0,3	0,8	1,1	0,6
30 GIORNI O PIÙ'	0,1	0,8	0,6	0,5

Dei ragazzi intervistati, 6 su 10 (60,4%) dichiarano di non aver “mai” bevuto alcol nella vita; si riscontrano però consistenti differenze a seconda della fascia d’età: si passa infatti dall’83,6% degli undicenni, al 55,3% dei tredicenni e al 27,6% dei quindicenni. Se la domanda viene riferita agli ultimi 30 giorni, due terzi (75,5%) dei ragazzi dichiarano di non aver mai consumato alcol. Anche in questo caso la percentuale si riduce con l’età (93% degli undicenni, 74% dei tredicenni, 48% dei quindicenni). Nella tabella seguente è riportata la frequenza di consumo di alcol quotidiana per genere ed età.

TABELLA 6.5 BIS FREQUENZA DI CONSUMO DI ALCOL OGNI GIORNO NEGLI ULTIMI 30 GIORNI, PER GENERE ED ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MASCHI	0,2	1,1	1,2	0,7
FEMMINE	0	0,4	0	0,1

In tabella 6.6 si ha il dettaglio dei consumi riferiti a specifiche bevande alcoliche.

TABELLA 6.6 FREQUENZA DI CONSUMI RIFERITI A SPECIFICHE BEVANDE ALCOLICHE (%)

	Ogni giorno	Ogni settimana	Ogni mese	Raramente/Mai
BIRRA	0,8	6,3	5,2	85,7
VINO	0,8	3,5	4,7	89,9
SUPERALCOLICI	0,5	1,8	4,4	91,7
ALCOLPOPS	0,9	2,2	5,1	91
SPRITZ	0,5	2,3	5	91
ALTRA BEVANDA ALCOLICA	0,6	2,5	5,2	90,1

HBSC ha da sempre indagato anche il fenomeno dell'ubriacatura. In tabella 6. si può dunque osservare la frequenza con cui i ragazzi di 11, 13 e 15 anni dichiarano di adottare questo comportamento scorretto.


TABELLA 6.7 FREQUENZA DI UBRIACATURA, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)
NO, MAI	95,2	89,3	64,5
SI, UNA VOLTA	3,6	6,5	14,6
SI, 2-3 VOLTE	1	2,9	13,5
SI, 4-10 VOLTE	0,2	1,1	5,3
PIÙ DI 10 VOLTE	0	0,1	2,1

Complessivamente la maggior parte dei ragazzi dichiara di non essersi mai ubriacato (85,9%), ma il fenomeno dell'ubriacatura presenta una notevole variazione fra le fasce d'età: si passa dal 95% degli undicenni che dichiarano di non essersi mai ubriacati al 89% dei tredicenni, al 64,5% dei quindicenni.

Nella figura 6.1 è possibile capire le differenze di genere ed età nella frequenza di ubriacatura; in particolare in coloro che dichiarano di essersi ubriacati 2 volte o più.

Figura 6.1 Frequenza di coloro che dichiarano di essere stati ubriachi 2 volte o più, per età e genere (%)




I maschi, in percentuale leggermente superiore alle femmine, dichiarano di essere stati ubriachi due volte o più (7,2% vs 6,5%); sia nei ragazzi che nelle ragazze il fenomeno aumenta significativamente con l'età.

Nell'indagine viene indagato anche il Binge Drinking, ovvero il consumo in una sola occasione di oltre 5 Unità Alcoliche (UA = 12 grammi di alcol puro) di una qualsiasi bevanda alcolica, fenomeno che si sta sempre più diffondendo tra i giovani¹⁹⁻²⁰.

A riguardo negli ultimi anni per contrastare tale fenomeno si stanno sviluppando strategie comunitarie come la Action plan on youth drinking and on heavy episodic drinking (2014-2016)²¹ con azioni che vanno dalla riduzione dell'accessibilità alle bevande alcoliche e all'esposizione alle pubblicità sull'alcol, ad attività di ricerca e monitoraggio sul tema²².

Nella figura 6.2 è possibile capire le differenze di genere nella frequenza di binge drinking.

Figura 6.2 Frequenza di coloro che dichiarano di aver consumato almeno una volta 5 o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione negli ultimi 12 mesi, per età e genere (%)




I maschi (22,6%), in percentuale superiore alle femmine (18%), dichiarano di aver consumato, in un'unica occasione, 5 o più bicchieri di alcol; tale fenomeno aumenta significativamente con l'età per entrambi.

CANNABIS

L'uso di droghe quali la cannabis e, in generale, la sperimentazione di sostanze stupefacenti, sono fra i comportamenti a rischio maggiormente discussi quando si studia lo stato di salute degli adolescenti; questo perché, nonostante gli sforzi compiuti a sostegno delle attività di prevenzione rivolte ai giovani, la diffusione del fenomeno rimane preoccupante²³⁻²⁴. Tale preoccupazione è legata in particolare al dato relativo all'età di inizio dell'uso di sostanze illecite, poichè i dati internazionali mostrano come il diffuso aumento dell'utilizzo di sostanze si accompagni ad un parallelo abbassamento dell'età di iniziazione²³. Nonostante si stia riscontrando come nel caso dell'alcol, una contrazione media nei consumi di cannabis lo studio di questo fenomeno rimane dunque una priorità per la Sanità Pubblica, soprattutto al fine di indirizzare nuove politiche preventive e di controllo.

Nella figura 6.3 è possibile capire le differenze di genere nella frequenza di quindicenni che consumano cannabis.

Figura 6.3 Frequenza dei quindicenni che hanno fumato cannabis, per genere (%)




Due terzi dei quindicenni (74%) non ha mai consumato cannabis nella vita; il 6% ha dichiarato di aver fumato cannabis almeno 30 volte o più: tale comportamento ha frequenza maggiore nei maschi (7,3%) rispetto alle femmine (4,3%).

GIOCO D'AZZARDO

Nel corso degli ultimi anni la diffusione del gioco d'azzardo fra gli adolescenti è stata riconosciuta come un'importante tematica di salute pubblica e un campo emergente di ricerca²⁵⁻²⁶. Gli adolescenti sono considerati un gruppo ad alto rischio di sviluppo di problemi correlati al gioco d'azzardo perché tendono a sottostimare i rischi legati al gioco e spesso falliscono nel richiedere forme di aiuto o di assistenza per problemi di gioco²⁷. Come accade per gli adulti, anche in questa fascia di età la letteratura indica come quest'abitudine possa portare a diverse conseguenze negative, come per esempio comportamenti criminali, difficoltà scolastiche, compromissione delle relazioni sociali (per es. con genitori e amici), abuso di sostanze, depressione e persino suicidio²⁸. D'altra parte il gioco d'azzardo è diventato ormai, nonostante i divieti previsti per legge, una popolare forma di svago fra gli adolescenti, tanto che dei recenti dati su 33 Stati Europei dimostrano come il 23% degli studenti ha dichiarato di aver giocato d'azzardo nell'ultimo anno (32% dei ragazzi vs 14% ragazze)²⁵. Diverse ricerche sono state condotte allo scopo di capire quali fattori e in che modo essi agiscano sull'inizio, lo sviluppo e la cronicizzazione del problema del gioco d'azzardo fra i più giovani. Ulteriori studi sono tuttavia necessari per comprendere meglio il ruolo di aspetti legati alla società, variabili socio-economiche e dei media nell'influenzare valori, credenze e comportamenti rispetto a questo vizio. Le domande sul gioco d'azzardo inserite per la prima volta nell'indagine HBSC Italia del 2014 (e riproposte nella rilevazione 2018) sono volte ad indagare sia l'esperienza dei ragazzi con scommesse e puntate di denaro nel corso della vita, che a valutare il loro grado di


‘coinvolgimento’ riuscendo ad individuare la quota di ragazzi ‘a rischio’ di sviluppare problemi di gioco e quelli che già presentano ‘seri problemi’. Nell’ambito dell’indagine HBSC 2018 è stato chiesto ai ragazzi di 15 anni di indicare se hanno mai scommesso e/o giocato denaro nella loro vita. Nella figura 6.4 si riporta tale informazione per genere.

Figura 6.4 Frequenza di quindicenni che hanno scommesso denaro, per genere (%)



La figura 6.5 mostra la percentuale di quindicenni con gioco d'azzardo a rischio e problematico.

Figura 6.5 Frequenza di quindicenni con gioco d'azzardo a rischio/problematico, per genere (%)



Il confronto tra maschi e femmine per quanto riguarda i comportamenti a rischio e problematici legati al gioco d'azzardo evidenzia, anche in questo caso, frequenza maggiore nei maschi.

CONCLUSIONI

Le abitudini degli adolescenti piemontesi, relativamente ai comportamenti di dipendenza si collocano in un trend in riduzione sia per quanto riguarda il fumo di sigaretta che l'alcol; in generale si riscontra una maggior diffusione di comportamenti a rischio fra i ragazzi più grandi e fra maschi, sebbene la differenza di genere si stia riducendo progressivamente, in particolare per il fumo di sigaretta, in cui le ragazze quindicenni che fumano ogni giorno superano i ragazzi (9% contro 7%).

Si mantiene pressoché costante la frequenza di quanti hanno già sperimentato l'uso di cannabis e il binge drinking (5 bicchieri o più di bevande alcoliche, anche diverse, in un'unica occasione), molto diffuso soprattutto fra i quindicenni (42,6%).

Anche il comportamento di abuso di alcol e cannabis tende ad aumentare con l'età e per queste sostanze rimane una differenza di genere che mostra frequenze maggiori nell'uso fra i ragazzi. Da rilevare che circa un quindicenne su 5 abbia già sperimentato due o più volte la condizione di ubriachezza.

L'attuale survey conferma la necessità di porre attenzione alla prevenzione del gioco d'azzardo: circa un terzo dei ragazzi quindicenni hanno provato a scommettere o a giocare denaro nella loro vita, e avrebbero un comportamento a rischio o problematico il 15% dei quindicenni.

Cos'è cambiato rispetto alle rilevazioni precedenti?

	2004	2008	2014	2018
Dichiarano di fumare ogni giorno (15 anni)*	17,9%	15,5%	11,9%	
Hanno fumato almeno una sigaretta 20 giorni o più negli ultimi 30 giorni (15 anni)				10,8%*
Dichiarano di bere alcol ogni giorno (15 anni)*	8%	5,2%	4,1%	
Hanno bevuto alcol 20 giorni o più negli ultimi 30 giorni (15 anni)				1,7%*
Ubriachi due volte o più (15 anni)	22%	19,7%	23,1%	20,9%
Non hanno mai fatto uso di cannabis (15 anni)	69,7%	76,9%	74,8%	74%

* relativamente all'abitudine quotidiana al fumo o a consumare alcol, nella lettura dei risultati 2018 occorre considerare che la domanda è stata formulata in modo diverso rispetto alle rilevazioni precedenti.

Nel 2018 la domanda circoscrive l'abitudine agli ultimi 30 giorni ("quanti giorni hai fumato almeno una sigaretta negli ultimi 30 giorni" – "quanti giorni hai bevuto alcol negli ultimi 30 giorni"), mentre nelle rilevazioni precedenti la domanda non faceva riferimento ad un'unità di tempo precisa ("Attualmente, quanto spesso fumi?" – "Attualmente con che frequenza bevi alcolici?") e consentiva una minor graduazione delle risposte (ogni giorno – ogni settimana – ogni mese – raramente – mai).

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹Nationa Institute on Drug abuse: <https://d14rmgtrwzf5a.cloudfront.net/>
- ²Gogtay N, Giedd JN, Lusk L, Hayashi KM, Greenstein D, Vaituzis AC, et al. (2004): Dynamic mapping of human cortical development during childhood through early adulthood. *Proc Natl Acad Sci U S A* 101:8174–8179.
- ³Oliveira LMFT, Santos ARMD, Farah BQ, Ritti-Dias RM, Freitas CMSM, Diniz PRB. Influence of parental smoking on the use of alcohol and illicit drugs among adolescents. *Einstein (Sao Paulo)*. 2019 Jan 14;17(1):eAO4377.
- ⁴Thomas RE, Baker PRA, Thomas BC. Family-Based Interventions in Preventing Children and Adolescents from Using Tobacco: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Acad Pediatr*. 2016 Jul;16(5):419-429.
- ⁵Sussman, S.; Skara, S.; and Ames, S.L. Substance abuse among adolescents. *Substance Use & Misuse* 43(12–13):1802–1828, 2008.
- ⁶Mokdad AH, Forouzanfar MH, Daoud F, Mokdad AA, et al.,. Global burden of diseases, injuries, and risk factors for young people's health during 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet*. 2016;387(10036):2383-401.
- ⁷GBD 2013 Risk Factors Collaborators, Forouzanfar MH, Alexander L, Anderson HR, Bachman VF, et al., Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet*. 2015;386(10010):2287-323.
- ⁸WHO report on the global tobacco epidemic 2019. https://www.who.int/tobacco/global_report/en/
- ⁹Cavallo F., Lemma P., Santinello M., Giacchi M. (a cura di) (2007), *Stili di vita e salute dei giovani italiani tra 11-15 anni*. Il Rapporto sui dati italiani dello studio internazionale HBSC. Padova: Cleup.
- ¹⁰Framework Convention on Tobacco Control – FCTC. <https://www.who.int/fctc/en/>
- ¹¹Audrain-McGovern J., Rodriguez D., Rodgers K., Cuevas J., Sass J., Riley T.(2012). Reward expectations lead to smoking uptake among depressed adolescents. *Drug and Alcohol Dependence*, 120: 181-189.
- ¹²Lambert M., Verduykt P., Van den Broucke S. (2002). Summary on the literature on young people, gender and smoking. In: Lambert M, Hublet A, Verduykt P, Maes L, Van den Broucke S. *Gender differences in smoking in young people*. Brussels, Belgium: Flemish Institute for Health Promotion.
- ¹³Hwang MS, Yeagley KL, Petosa R. A meta-analysis of adolescent psychosocial smoking prevention programs published between 1978 and 1997 in the United States. *Health Educ Behav*. 2004;31(6):702-19.
- ¹⁴Looze Md, Raaijmakers Q, Bogt TT, Bendtsen P, Farhat T, Ferreira M, Godeau E, Kuntsche E, Molcho M, Pfortner TK, Simons-Morton B, Vieno A, Vollebergh W, Pickett W. Decreases in adolescent weekly alcohol use in Europe and North America: evidence from 28 countries from 2002 to 2010. *Eur J Public Health*. 2015 ;25 Suppl 2:69-72.
- ¹⁵Vieno A, Altoè G, Kuntsche E, Elgar FJ. Do public expenditures on health and families relate to alcohol abstaining in adolescents? Multilevel study of adolescents in 24 countries. *Drug Alcohol Rev*. 2018;37 Suppl 1:S120-S128. ¹⁶Poikolainen K., Tuulio-Henriksson A., Aalto-Setälä T., Marttunen M., Lönnqvist J. (2001). Predictors of alcohol intake and heavy drinking in early adulthood: a 5-year follow-up of 15-19 year-old Finnish adolescents. *Alcohol and alcoholism*, 36: 85-88.
- ¹⁷Engels R.C., Scholte R.H., Van Lieshout C.F., De Kemp R., Overbeek G.J. (2006). Peer group reputation and smoking and alcohol consumption in early adolescence. *Addictive Behaviors*, 31: 440–449.
- ¹⁸Jo Inchley, Dorothy Currie, Alessio Vieno, Torbjørn Torsheim, Carina Ferreira-Borges, Martin M. Weber, Vivian Barnekow & João Breda. Adolescent alcohol-related behaviours: trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014.
- ¹⁹National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. *Drinking Levels Defined*. Available from: <https://www.niaaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption/moderate-binge-drinking>.
- ²⁰M. Stolle, PM. Sack e R. Thomasius, Binge drinking in childhood and adolescence: epidemiology, consequences, and interventions., in *Dtsch Arztebl Int*, vol. 106, n° 19, maggio 2009, pp. 323–8.
- ²¹Action Plan on Youth Drinking and on Heavy Episodic Drinking (Binge Drinking) (2014-2016). https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/alcohol/docs/2014_2016_actionplan_youthdrinking_en.pdf
- ²²Scafato E, Ghirini S, Gandin C, Vichi M, Scipione R e il gruppo di lavoro CSDA (Centro Servizi Documentazione Alcol). *Epidemiologia e monitoraggio alcol-correlato in Italia e nelle Regioni. Valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute*. Rapporto 2018. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2018. (Rapporti ISTISAN 18/2).
- ²³Fink DS. Commentary on Burdzovic Andreas & Bretteville-Jensen (2017): Cannabis use opportunities-an under-researched factor in substance use epidemiology. *Addiction*. 2017;112(11):1983-1984.
- ²⁴Burdzovic Andreas J, Bretteville-Jensen AL. Ready, willing, and able: the role of cannabis use opportunities in understanding adolescent cannabis use. *Addiction*. 2017;112(11):1973-1982.
- ²⁵Molinaro S, Benedetti E, Scalese M, Bastiani L, Fortunato L, Cerrai S, Canale N, Chomynova P, Elekes Z, Feijão F, Fotiou A, Kokkevi A, Kraus L, Rupšienė L, Monshouwer K, Nociar A, Strizek J, Urdih Lazar T. Prevalence of youth gambling and potential influence of substance use and other risk factors throughout 33 European countries: first results from the 2015 ESPAD study. *Addiction*. 2018;113(10):1862-1873.
- ²⁶Calado F, Alexandre J, Griffiths MD. Prevalence of Adolescent Problem Gambling: A Systematic Review of Recent Research. *J Gambl Stud*. 2017;33(2):397-424.

²⁷Canale N, Vieno A, Ter Bogt T, Pastore M, Siciliano V, Molinaro S. Adolescent Gambling-Oriented Attitudes Mediate the Relationship Between Perceived Parental Knowledge and Adolescent Gambling: Implications for Prevention. *Prev Sci.* 2016;17(8):970-980.

²⁸Blinn-Pike L, Worthy SL, Jonkman JN. Adolescent gambling: a review of an emerging field of research. *J Adolesc Health.* 2010;47(3):223-36

7. SALUTE E BENESSERE

INTRODUZIONE

La salute consente all'uomo di raggiungere e soddisfare i propri obiettivi di vita e, nella definizione positiva proposta dall'OMS, si rappresenta come un capitale che al fianco di quelle fisiche riconosce altre categorie di risorse individuali e sociali, permettendo così agli individui di essere attivi nei normali contesti di vita e di lavoro¹⁻³. Il benessere può invece essere definito come una condizione di equilibrio in cui l'individuo percepisce di avere le risorse fisiche, psicologiche e sociali di cui ha bisogno per rispondere alle sfide che la vita gli propone. In assenza di questo equilibrio il soggetto tende a percepire una condizione di ansia che si può accompagnare a sintomi di stress quali i disturbi del sonno o il mal di stomaco fino ad arrivare alla depressione. Ogni soggetto è quindi portatore di risorse interne (potenzialità fisiche, psicologiche, cognitive, ecc.) che sono però in continua interazione con le risorse presenti nei diversi livelli del sistema ecologico del quale si trova a far parte, attraverso dinamiche complesse che rispondono al principio della causalità reciproca. Accettare questa impostazione richiede che nell'interrogarsi sulla salute di una popolazione non ci si concentri più sui soli fattori di rischio delle malattie ma si ampli l'orizzonte di osservazione, cercando quindi di mettere a fuoco le diverse "risorse" di cui il soggetto ha bisogno, non solo per rispondere alle necessità di tipo fisiologico ma anche a quelle di tipo culturale, sociale e di altro tipo ancora: risorse che rappresentano una sorta di capitale sul quale fondare la propria salute⁴.

Valutare la salute a livello di popolazione non è certo compito di facile esecuzione⁵ e ancora più complesso può apparire quello di definire e monitorare la salute dei giovani in età adolescenziale: è in questa fascia di età che troviamo i tassi di mortalità e morbosità più bassi che nel resto dell'arco della vita ma è anche questa l'età in cui gli aspetti relazionali e di contesto di vita cominciano a giocare un ruolo fondamentale dimostrandosi in grado di determinare la condizione di salute del futuro adulto²⁻³. Quest'influenza, già nota per i principali fattori di rischio - come una scorretta alimentazione, il sovrappeso-obesità o la presenza di comportamenti e abitudini voluttuarie nei confronti delle patologie cardio-vascolari o tumorali - risulta evidente anche per alcune tra quelle che prima sono state definite come risorse dell'ambiente ecologico del soggetto rispetto a condizioni su cui si accentra una sempre maggiore attenzione: l'ansia, la depressione e la nevrosi⁶.

In questo contesto lo studio HBSC offre l'opportunità di monitorare alcune delle variabili più importanti e utili a descrivere questo momento definito come centrale nello sviluppo dell'individuo, basandosi sull'auto-percezione dei ragazzi del proprio stato di salute e del proprio benessere nei diversi ambiti della loro vita, più che sulla frequenza di malattia. Le variabili utilizzate come descrittori dello stato di salute e del benessere psico-fisico sono raccolte in quattro macro categorie:

- a) Percezione del proprio stato di salute (eccellente, buono, discreto, scadente);
- b) Percezione del proprio benessere (valutato su una scala da 0 a 10);
- c) Presenza e frequenza (ogni giorno, più di una volta a settimana, una volta a settimana, una volta al mese, raramente o mai) di alcuni sintomi che sembrano essere importanti indicatori di benessere/malessere, e che verranno descritti all'interno di questo capitolo;

d) Consumo di farmaci (nessun farmaco nell'ultimo mese, un farmaco o più di un farmaco nell'ultimo mese).

In questo capitolo si riporta, inoltre, una sezione relativa alla salute sessuale, alla frequenza di infortuni e al rapporto tra pari.

SALUTE PERCEPITA

Lo studio HBSC come si è detto precedentemente rivolge la propria attenzione ad una popolazione prevalentemente sana che, sotto il profilo epidemiologico, presenta livelli molto bassi sia di morbosità che di mortalità. Questi ultimi indicatori, appropriati per descrivere il profilo di salute di una comunità nel suo complesso, hanno una ridotta capacità descrittiva in questa particolare fascia di età per la quale è invece più appropriato affidarsi alla percezione soggettiva del proprio stato di salute⁷. Studi recenti condotti nella popolazione adulta hanno dimostrato che percepire la propria salute come meno buona sia effettivamente correlato ad una ridotta aspettativa di vita e hanno descritto una chiara relazione tra la salute percepita e quella misurata dai professionisti della sanità⁶⁻⁷. Sembra quindi che chiedere direttamente a una persona come si senta sia un modo affidabile per conoscere la sua condizione di salute. Anche per gli adolescenti la percezione dello stato di salute presenta un andamento coerente con la presenza/assenza di sintomi di ansietà e depressione⁸ con il successo/insuccesso scolastico e con il vivere positivamente o meno l'esperienza scolastica e la qualità della comunicazione con i genitori⁹.


Nella tabella 7.1 sono riportate le frequenze percentuali relative alla valutazione del proprio stato di salute, per classe di età.

TABELLA 7.1 "DIRESTI CHE LA TUA SALUTE È'..., PER ETÀ" (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
ECCELLENTE	38,3	38,6	28,8	36,2
BUONA	54,8	52,9	59,4	55,2
DISCRETA	6	8,3	10,6	7,9
SCADENTE	0,9	0,2	1,2	0,7

Dai dati in tabella si evince che circa il 91% dei ragazzi considera il suo stato di salute eccellente o buono. Considerando le diverse classi di età, emerge una percezione molto positiva del proprio stato di salute nei ragazzi più piccoli in misura maggiore.

Nella Figura 7.1 sono riportate differenze tra maschi e femmine riguardo al giudizio “buona o eccellente” relativo alla propria salute, per classe di età.



Il giudizio positivo circa la propria salute riguarda la maggior parte degli studenti in tutte le fasce d'età, con un calo all'aumentare dell'età per le ragazze; in generale le femmine sembrano considerare la propria salute meno buona dei maschi, soprattutto le ragazze quindicenni.

BENESSERE PERCEPITO

Un buono stato di salute è caratterizzato non solo dall'assenza di malattia ma anche dalla presenza di benessere, di cui la valutazione positiva di soddisfazione per la propria vita è considerato un importante aspetto^{6,9}. Tra gli adolescenti un alto livello di soddisfazione per la propria vita si è dimostrato, infatti, associato al mancato uso di sostanze¹⁰ e a più alti livelli di attività fisica¹¹. Lo studio HBSC, per descrivere il benessere percepito, chiede ai ragazzi di dichiarare in quale posizione, su una scala tra 0 e 10, porrebbero il loro grado di soddisfazione per la vita: tale tecnica di misurazione (denominata scala di Cantril) si è rivelata efficace sia negli adulti che nei ragazzi¹².


Il giudizio espresso dai ragazzi riguardo alla percezione del proprio benessere è riportato in tabella 7.2 con raggruppamenti “da 0 a 5” e “maggiore/uguale a 6”. Le percentuali riguardano i ragazzi di 11, 13 e 15 anni.

TABELLA 7.2 “IN GENERALE, SU CHE GRADINO DELLA SCALA SENTI DI TROVARTI IN QUESTO MOMENTO DA 0 (= LA PEGGIOR VITA POSSIBILE) A 10 (= LA MIGLIOR VITA POSSIBILE)”, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
0-5	9	11,8	12,7	10,9
≥6	91	88,2	87,3	89,1

Il confronto tra le diverse classi di età mostra differenze nella percezione del proprio benessere. Un giudizio più critico è stato espresso dai ragazzi più grandi. Nella Figura 7.2 le percentuali di percezione del benessere da parte dei ragazzi vengono distinte tra maschi e femmine con raggruppamenti 0-5 e ≥ 6 .

Figura 7.2 *Frequenza del benessere misurato su scala da 0 (= La peggior vita possibile) a 10 (= La miglior vita possibile) con raggruppamenti 0-5 e ≥ 6 , per genere (%)*



Il confronto tra maschi e femmine evidenzia differenze significative a favore dei maschi, che valutano la propria vita in modo maggiormente positivo: il 92% dei ragazzi attribuisce un punteggio maggiore o uguale a 6, rispetto all'86% delle ragazze.

SINTOMI RIPORTATI

Nello studiare la salute degli adolescenti è importante indagare la complessità dei fattori che sostengono la percezione che loro stessi hanno della condizione riferita interrogandoli, ad esempio, sui sintomi di cui dichiarano di soffrire, anche e soprattutto in assenza di una diagnosi di malattia. L'esperienza soggettiva di sintomi, infatti, oltre che ad un maggior uso di farmaci e di servizi sanitari¹³, si dimostra anche associata ad un basso successo e a negative esperienze scolastiche¹⁴, tra le quali ritroviamo il bullismo attivo e subitico e le cattive relazioni con i pari¹⁵. Tale quadro, confermato anche dall'uso di più sofisticate tecniche di analisi, sembra suggerire una relazione tra il riportare specifici sintomi di origine psicosomatica e situazioni di stress¹⁰. Lo studio HBSC esplora questa dimensione chiedendo ai ragazzi la frequenza con cui soffrono di uno dei seguenti otto sintomi: mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena, difficoltà ad addormentarsi, giramenti di testa, sentirsi giù di morale, sentirsi irritabili o di cattivo umore, sentirsi nervoso. L'uso di tale lista è stato sottoposto ad una validazione quali-quantitativa che ha permesso di verificare che i ragazzi posseggono le capacità

cognitive che permettono loro di comprendere e differenziare i concetti sui quali vengono interrogati e affidabilità nel valutare e riportare i sintomi¹⁵.

La tabella 7.3 riporta le frequenze percentuali riferite alle tre classi di età (11, 13 e 15 anni) dei sintomi legati ai disturbi fisici, umorali e comportamentali avuti negli ultimi sei mesi.

TABELLA 7.3 “NEGLI ULTIMI SEI MESI: QUANTE VOLTE HAI AVUTO (O TI SEI SENTITO) UNO DEI SEGUENTI SINTOMI: AVERE MAL DI TESTA, AVERE MAL DI STOMACO, AVERE MAL DI SCHIENA, SENTIRSI GIÙ, SENTIRSI IRRITABILE O DI CATTIVO UMORE, SENTIRSI NERVOSO, AVERE DIFFICOLTÀ AD ADDORMENTARSI, AVERE SENSO DI VERTIGINI”, PER ETÀ (%)


	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
CIRCA OGNI GIORNO	36,4	39	36	37,2
PIÙ DI UNA VOLTA A SETTIMANA	27,2	28,5	32,5	28,9
CIRCA UNA VOLTA A SETTIMANA	18,9	19,3	18,1	18,8
CIRCA UNA VOLTA AL MESE	14,6	11,2	11,6	12,7
RARAMENTE O MAI	2,9	2,1	1,8	2,3

Le percentuali riscontrate non evidenziano particolari differenze tra le varie classi di età.

Precedenti studi hanno considerato questi sintomi come suddivisibili in due categorie distinte¹⁵⁻¹⁶: una che comprende sintomi a prevalente componente somatica (l'aver mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena, difficoltà ad addormentarsi e senso di vertigini), e l'altra che comprende sintomi a prevalente componente psicologica (sentirsi giù, irritabile e nervoso).


Le Figure 7.3 e 7.4 evidenziano, rispettivamente, le frequenze di sintomi somatici e psicologici avvertiti dai ragazzi (maschi, femmine e totale) quotidianamente.

Figura 7.3 Frequenze di coloro che dichiarano di soffrire ogni giorno di almeno un sintomo tra: mal di testa, mal di stomaco, mal di schiena, difficoltà ad addormentarsi, senso di vertigini, per genere (%)



Il sintomo somatico maggiormente riferito è l'insonnia, con una percentuale pari al 13,8%, seguito dal mal di testa e mal di schiena, con una percentuale del 6,8%, riportato in misura maggiore dalle femmine rispetto ai maschi.

Figura 7.4 Frequenza di coloro che dichiarano di soffrire ogni giorno di almeno un sintomo tra sentirsi giù, irritabile e nervoso, per genere (%)



Il sintomo psicologico maggiormente riferito è il sentirsi nervoso, con una percentuale del 16,8%. Gli altri due sintomi, sentirsi giù di morale e sentirsi irritabili sono rappresentati in misura simile. Tutti i sintomi sono riportati in maniera significativamente maggiore dalle ragazze.

TABELLA 7.4 “FREQUENZA DI COLORO CHE DICHIARANO DI SOFFRIRE DI ALMENO DUE SINTOMI PER PIÙ DI UNA VOLTA A SETTIMANA”, PER GENERE ED ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
MASCHI	40,3	41,2	39,4	40,4
FEMMINE	50,2	62,7	71,9	59,7

Riportano almeno due sintomi almeno una volta a settimana 6 femmine su 10 (59,7%) contro 4 maschi su 10 (40,4%). Fra le ragazze si riscontra anche una maggior presenza di sintomi all'aumentare dell'età.

TABELLA 7.5 “FREQUENZA DI COLORO CHE DICHIARANO DI SOFFRIRE OGNI GIORNO DI ALMENO UN SINTOMO” PER GENERE ED ETÀ”

	11 ANNI (%)	13 ANNI (%)	15 ANNI (%)	TOTALE
MASCHI	33,7	32,6	23,6	30,8
FEMMINE	39,5	46,2	50,7	44,5

Si evidenzia che 3 ragazzi su 10 (30,8%) e più di 4 ragazze su 10 (44,5%) dichiarano almeno un sintomo ogni giorno. La percentuale di ragazze sintomatiche aumenta con l'età, mentre per i maschi il fenomeno ha un andamento opposto.

UTILIZZO DI FARMACI

Come si diceva nella sezione precedente, l'esperienza soggettiva di sintomi è un indicatore di salute che spesso si associa ad un maggior uso di farmaci e di servizi sanitari¹³. Nella popolazione adolescente l'analisi dell'uso di farmaci è relativamente nuova, introdotta infatti per la prima volta nel report 2010¹⁷. Nell'indagare questo comportamento viene chiesto ai ragazzi il ricorso, nell'ultimo mese (mai, una volta, più di una volta) a farmaci per alcuni specifici disturbi: mal di testa, mal di stomaco, difficoltà ad addormentarsi, nervosismo, altro (tabella 7.5).

TABELLA 7.5 "NELL'ULTIMO MESE HAI PRESO MEDICINE O FARMACI (PER ALMENO UN SINTOMO)?", PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
NO	43,6	40,2	37,2	40,9
SI	56,4	59,8	62,8	59,1

Più della metà dei ragazzi dichiara di aver fatto uso di farmaci nell'ultimo mese per almeno uno dei sintomi precedentemente descritti.

ABITUDINI SESSUALI

Il questionario HBSC rivolto ai ragazzi quindicenni contiene una breve sezione riguardante le abitudini sessuali e il tipo di contraccettivo utilizzato durante il rapporto sessuale. La tabella 7.6 mostra la frequenza di quindicenni che dichiarano di aver avuto rapporti sessuali completi.

TABELLA 7.6 FREQUENZE DI RAGAZZI QUINDICENNI CHE DICHIARANO DI AVER AVUTO RAPPORTI SESSUALI COMPLETI, PER GENERE (%)

	Maschi (%)	Femmine (%)	Totale (%)
SI	24,9	17,9	21,7
NO	75,1	82,1	78,3

Come si rileva dalla tabella 7.6 il 21,7% dei quindicenni dichiara di aver avuto rapporti sessuali completi; i maschi in percentuale maggiore delle femmine.

La tabella 7.7 analizza per genere le frequenze percentuali di utilizzo, nell'ultimo rapporto sessuale, di metodi contraccettivi quali preservativo, pillola, coito interrotto e altri tipi di contraccettivi. La domanda è stata posta solo a coloro che avevano dichiarato di avere avuto rapporti sessuali completi.

TABELLA 7.7 FREQUENZE PERCENTUALI DEL TIPO DI METODO CONTRACCETTIVO UTILIZZATO NELL'ULTIMO RAPPORTO SESSUALE, PER GENERE (%): "L'ULTIMA VOLTA CHE HAI AVUTO UN RAPPORTO SESSUALE, TU O IL TUO PARTNER AVETE UTILIZZATO ..."

	Maschi (%)	Femmine (%)	Totale (%)
PRESERVATIVO	70,4	68,5	69,7
PILLOLA	16,1	20,8	17,9
COITO INTERROTTO	34,5	46,5	39,2
ALTRI METODI	5,5	1,5	4

Non si evincono differenze rilevanti fra maschi e femmine relativamente al tipo di metodo contraccettivo che riferiscono di aver utilizzato nell'ultimo rapporto.

INFORTUNI

Ai ragazzi è stato chiesto il numero delle volte che, negli ultimi dodici mesi, hanno avuto infortuni per i quali è stato necessario un intervento da parte di personale medico o infermieristico. Nella tabella 7.8 sono riportate le frequenze percentuali relative a tali infortuni per i ragazzi di 11, 13 e 15 anni.

TABELLA 7.8 "NEGLI ULTIMI 12 MESI, QUANTE VOLTE HAI AVUTO INFORTUNI PER I QUALI HAI DOVUTO RICORRERE ALLE CURE DI UN MEDICO O DI UN INFERMIERE/A?, PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
NON NEGLI ULTIMI 12 MESI	51,6	49,3	53,5	51,2
UNA VOLTA	28,1	27,4	24,8	27,1
DUE VOLTE	11,1	12,8	12,5	12
TRE VOLTE	4,2	5,1	4,5	4,6
QUATTRO O PIU'	5	5,4	4,7	5,1

In generale circa la metà dei ragazzi (51,2%) dichiara di non aver avuto infortuni che abbiano richiesto cure mediche negli ultimi 12 mesi, con una percentuale leggermente maggiore nelle femmine (57,9%) rispetto ai maschi(45,2%).

RAPPORTO TRA PARI

Per indagare il rapporto dei ragazzi con i propri pari, sono state elaborate alcune domande volte ad identificare il sostegno che i ragazzi ricevono dalla propria rete di coetanei. In tabella 7.9 è possibile capire quanto riportato dai ragazzi.

TABELLA 7.9 FREQUENZA DI RAGAZZI CHE DICHIARANO DI ESSERE "ABBASTANZA D'ACCORDO", "D'ACCORDO" O "MOLTO D'ACCORDO" CON LE QUATTRO AFFERMAZIONI..., PER ETÀ (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
I MIEI AMICI PROVANO AD AIUTARMI	74,3	74,5	74,2	74,3
POSSO CONTARE SUI MIEI AMICI QUANDO LE COSE VANNO MALE	78	75,8	75,6	76,6
HO AMICI CON CUI CONDIVIDERE GIOIE E DISPIACERI	85,7	84,5	83,3	84,7
POSSO DAVVERO PARLARE DEI MIEI PROBLEMI CON I MIEI AMICI	71,9	76,8	74,2	74,2

In generale più di 8 ragazzi e ragazze su 10 dichiarano di avere amici con cui condividere emozioni ed esperienze e tre quarti di loro affermano di ricevere sostegno dagli amici.

CONCLUSIONI

I dati sullo stato di salute dei giovani piemontesi, così come da loro percepito, dipingono un quadro sostanzialmente positivo per la maggior parte degli studenti in tutte le fasce d'età: *più di 8 su 10 ritengono la propria salute buona o eccellente.*

Tuttavia, va specificato che alla richiesta di riferire in merito a sintomi somatici o psicologici, questi appaiono piuttosto frequenti. Riportano almeno un sintomo ogni giorno 3 ragazzi e più di 4 ragazze su 10. Le ragazze in generale tendono a percepire la propria salute in maniera meno positiva e con più sintomi dichiarati rispetto ai ragazzi, in misura maggiore fra le ragazze più grandi.

Il 60% degli adolescenti di 13 e 15 anni riporta di aver utilizzato almeno un farmaco nell'ultimo mese e quasi la metà dei quindicenni nell'ultimo anno ha subito un infortunio per cui ha dovuto ricorrere alle cure di un sanitario.

Rispetto alle edizioni precedenti non si rilevano cambiamenti evidenti nella percezione della propria condizione di salute e benessere da parte dei ragazzi, che complessivamente appare positiva, nonostante i sintomi dichiarati.

La consapevolezza di avere una rete di relazioni positive, su cui poter contare, fa parte delle risorse che costruiscono il patrimonio di benessere delle persone: la maggior parte dei ragazzi, a tutte le età dichiara di avere amici con cui condividere emozioni ed esperienze e da cui ricevere sostegno.

Per quanto riguarda le abitudini sessuali, e in particolare la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmesse, un dato che merita attenzione è l'uso del preservativo, riferito da 7 quindicenni su 10, fra quanti dichiarano di aver avuto rapporti sessuali.

Cos'è cambiato rispetto alle rilevazioni precedenti?

	2004	2008	2014	2018
Percezione di salute buona o eccellente (11 anni)	90,5%	91,5%	93,6%	93,1%
Percezione di salute buona o eccellente (15 anni)	82,6%	91,2%	84,6%	88,3%
Almeno un sintomo ogni giorno (11 anni)	29,5%	27,5%	30,3%	36,5%
Almeno un sintomo ogni giorno (15 anni)	29,9%	27,6%	35,3%	36%
Almeno un farmaco nell'ultimo mese (13 e 15 anni)		57,5%	58,8%	61,3%
Hanno avuto rapporti sessuali (15 anni)	24,4%	22,4%	26,3%	21,7%
Hanno usato il preservativo nell'ultimo rapporto (15 anni)	75%	81,2%	63,2%	69,7%
Almeno un infortunio nell'ultimo anno (15anni)	46,4%	45,7%	39%	46,7%

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹Herzlich C. (1973). *Health and illness*. London: Academic Press.
- ²World Health Organization (1998). *Health promotion glossary*. Geneva, WHO.
- ³Baum, F., Lawless, A., Williams, C. (2013). *Health in All Policies from international ideas to local implementation: policies, systems and organizations*. Health promotion and the policy process: practical and critical theories. Oxford: Oxford University Press.
- ⁴P. Lemma. *Promuovere salute. Principi e strategie*. Il pensiero scientifico, 2018.
- ⁵Rashad, H., Khadr, Z. (2014). Measurement of health equity as a driver for impacting policies. *Health Promotion International*, 29:i68-i82.
- ⁶Friedman, HS., Kern, ML. (2014). Personality, Well-Being, and Health. *Annual Review of Psychology*, 65:719-742.
- ⁷Bowling, A. (2014). *Research methods in health*. New York, McGraw-Hill Education.
- ⁸de Matos M.G., Barrett P., Dadds M., Shortt A. (2003). Anxiety, depression and peer relationships during adolescence: results from the Portuguese National Health Behaviour in School-aged Children survey. *European Journal of Psychology of Education*, 18:3-14.
- ⁹Ravens-Sieberer U., Kokonyei G., Thomas C. School and health (2004). In: Currie C, Roberts C, Morgan A. Smith R., Settertobulte W., Samdal O., Barnekov Rasmussen V. (Ed.). *Young people's health in context: international report from the HBSC 2001/2002 survey*. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
- ¹⁰Lemma, P., Borraccino, A., Berchiolla, P., Dalmasso, P., Charrier, L., Vieno, A., Lazzeri G, Cavallo, F. (2014). Well-being in 15-year-old adolescents: a matter of relationship with school. *Journal of Public Health*.
- ¹¹Thome J., Espelage D.L. (2004) Relations among exercise, coping, disordered eating and psychological health among college students. *Eating Behaviors*, 5:337-51.
- ¹²Cantril H. (1965). *The pattern of human concern*. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- ¹³Belmaker E (1985). Use of medical services by adolescents with non-specific somatic symptoms. *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 1:1-2.
- ¹⁴Torsheim T., Wold B. (2001). School-related stress, school support, and somatic complaints: a general population study. *Journal of Adolescence Research*, 16:293-303.
- ¹⁵Haugland S., Wold B. (2001a). Subjective health complaints in adolescence – Reliability and validity of survey methods. *Journal of Adolescence*, 24:611-24.
- ¹⁶Haugland S., Wold B., Stevenson J., Aarø L.E., Woynarowska B. (2001b). Subjective health complaints in adolescence – a cross-national comparison of prevalence and dimensionality. *European Journal of Public Health*, 11:4-10.
- ¹⁷Cavallo, F., Giacchi, M., Vieno, A., Galeone, D., Lamberti, A., Nardone, P., Andreozzi, S. (2013). *Studio HBSC-Italia (Health Behaviour in School-aged Children): rapporto sui dati 2010*. Rome: Istituto Superiore di Sanità.

8. 1 SOCIAL MEDIA

INTRODUZIONE

Nell'ultimo decennio, l'uso delle nuove tecnologie è diventato sempre più diffuso e importante soprattutto tra (pre)adolescenti e giovani in tutto il mondo. Infatti, per la maggior parte degli adolescenti europei e nordamericani, internet è disponibile 24 ore su 24 e, quindi, utilizzato per moltissimi motivi diversi: giocare ai videogiochi online, ricercare informazioni, passare il tempo e stabilire e mantenere relazioni con gli altri attraverso l'uso dei social network¹. La letteratura scientifica sul tema dell'uso dei social media tra i più giovani indica che, quando limitato e responsabile, tale uso può avere un impatto positivo sul benessere dei ragazzi in termini di maggiore percezione di supporto sociale, connessione con i pari e impegno civico²⁻⁴. D'altra parte, studi recenti hanno mostrato che un uso eccessivo e/o problematico delle nuove tecnologie può avere ripercussioni sulla salute psico-fisica dei più giovani in termini di maggiori livelli di ansia, depressione e sintomi fisici^{5,6}. In questo senso, sebbene la ricerca in questo ambito stia procedendo velocemente, l'analisi delle motivazioni, dei benefici e dei rischi che i ragazzi incontrano sui social media è attualmente riconosciuta come fondamentale a livello nazionale e internazionale.

L'USO DEI SOCIAL MEDIA

Per quanto riguarda i possibili benefici e rischi in termini di connessione sociale, lo studio HBSC rileva la frequenza con cui i ragazzi hanno contatti online con i loro amici, con amici di un gruppo allargato, con altre persone (es. familiari, compagni di classe, insegnanti) e con persone conosciute online. In tabella 8.1 sono riportate le risposte dei ragazzi.

TABELLA 8.1 "QUANTE VOLTE HAI CONTATTI ONLINE GIORNALIERI O PIU' VOLTE AL GIORNO CON LE SEGUENTI PERSONE", PER ETA'. (%)

	11 anni (%)	13 anni (%)	15 anni (%)	Totale
AMICI STRETTI	65,8	83,7	86,5	78,7
AMICI DI UN GRUPPO ALLARGATO	45,1	58,9	58,2	54,2
AMICI CONOSCIUTI TRAMITE INTERNET	8,5	17,7	15,2	13,8
ALTRE PERSONE, NON AMICI (ES. GENITORI, FRATELLI/SORELLE, ECC.)	52	61	61	58

Dalla tabella si evince che i ragazzi hanno frequenti contatti giornalieri on line soprattutto con gli amici stretti (79%); familiari (58%) e gruppo allargato di amici (54%) sono gli altri contatti privilegiati, mentre poco frequenti sono gli scambi con persone conosciute online (14%). L'abitudine è più diffusa fra i tredicenni e i quindicenni.

Nell'indagine HBSC 2018 sono state, inoltre, inserite per la prima volta alcune domande relative all'uso problematico dei social media con lo scopo di evidenziare la diffusione attuale di un fenomeno che sembra in continuo divenire. Nello specifico, ai ragazzi è stato chiesto di rispondere ad alcune domande volte ad indagare una motivazione negativa all'uso dei social: la preferenza per le interazioni sociali online rispetto a quelle faccia a faccia^{7,8}. In tabella 8.2 sono riportate le risposte dei ragazzi per età e genere.


TABELLA 8.2 FREQUENZA DI RAGAZZI CHE SONO D'ACCORDO E MOLTO D'ACCORDO CON LE AFFERMAZIONI:..., PER ETÀ (%)

	11 anni (%)		13 anni (%)		15 anni (%)		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F
“SU INTERNET PARLO PIÙ FACILMENTE DEI MIEI SEGRETI, PIUTTOSTO CHE FACCIA A FACCIA”	8,4	9,1	12,9	11,4	14,3	13,4	11,5	10,9
“SU INTERNET PARLO PIÙ FACILMENTE DEI MIEI SENTIMENTI PIÙ PROFONDI PIUTTOSTO CHE IN UN INCONTRO FACCIA A FACCIA”	10,3	14,8	17,1	19,1	16,1	20,2	14,2	17,7
“SU INTERNET PARLO PIÙ FACILMENTE DELLE MIE PREOCCUPAZIONI PIUTTOSTO CHE IN UN INCONTRO FACCIA A FACCIA”	10,1	10,9	14,4	15,1	12,9	15,3	12,3	13,4

In generale meno di 2 ragazzi su 10 preferiscono le interazioni attraverso i social rispetto a quelle faccia a faccia per condividere i propri segreti, sentimenti o preoccupazioni, con percentuali maggiori fra i ragazzi e le ragazze più grandi.

Inoltre, gli indicatori della Social Media Disorder Scale⁹ offrono una panoramica dei sintomi più frequenti dell'uso problematico dei social media. In questo modo è possibile osservare la prevalenza di ragazzi a rischio di sviluppare una problematicità legata dell'uso dei social media (cioè i ragazzi che hanno dichiarato di riconoscersi in 6 o più sintomi), come rappresentato in figura 8.1.

Figura 8.1 Frequenza di ragazzi che fanno uso problematico dei social media, per età e genere (%)



Non si evidenziano differenze significative per età nell'uso problematico dei social media. Le ragazze tredicenni e quindicenni hanno un uso più problematico dei ragazzi.

CONCLUSIONI

I dati ci confermano quanto l'uso dei social media sia diffuso fra gli adolescenti per mantenere i contatti quotidiani, soprattutto con le amicizie più strette (8 su 10) e i familiari (6 su 10). Tuttavia le interazioni on line non sono il mezzo preferito per condividere i propri segreti, sentimenti o preoccupazioni: meno di 2 ragazzi su 10 preferiscono le interazioni attraverso i social rispetto a quelle faccia a faccia.

Per la prima volta nel 2018, sono state inserite alcune domande relative all'uso problematico dei social media, nello specifico è emerso che tale problema è maggiore nelle femmine per ogni fascia d'età considerata rispetto ai coetanei maschi.


BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- ¹Griffiths, M. D., Kuss, D. J., Billieux, J., & Pontes, H. M. (2016). The evolution of Internet addiction: A global perspective. *Addictive Behaviors*, 53, 193-195
- ²Barry, C. T., Sidoti, C. L., Briggs, S. M., Reiter, S. R., & Lindsey, R. A. (2017). Adolescent social media use and mental health from adolescent and parent perspectives. *Journal of adolescence*, 61, 1-11.
- ³Lenzi, M., Vieno, A., Altoè, G., Scacchi, L., Perkins, D.D., Zukauskienė, R., & Santinello, M. (2015). Can Facebook informational use foster adolescent civic engagement? *American Journal of Community Psychology*, 55, 444–454.
- ⁴Valkenburg, P. M., & Peter, J. (2007). Preadolescents' and adolescents' online communication and their closeness to friends. *Developmental Psychology*, 43, 267-277.
- ⁵Marino, C., Gini, G., Vieno, A., & Spada M.M. (2018). The associations between problematic Facebook use, psychological distress and well-being among adolescents and young adults: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 15(226), 274-281
- ⁶Van Den Eijnden, R., Koning, I., Doornwaard, S., Van Gurp, F., & Ter Bogt, T. (2018). The impact of heavy and disordered use of games and social media on adolescents' psychological, social, and school functioning. *Journal of behavioral addictions*, 7(3), 697-706
- ⁷Marino, C., Vieno, A., Altoè, G., & Spada, M. M. (2017). Factorial validity of the Problematic Facebook Use Scale for adolescents and young adults. *Journal of Behavioral Addictions*, 6(1), 5–10.
- ⁸Caplan, S. (2010). Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. *Computers in Human Behavior*, 25(5), 1089–1097.
- ⁹Van den Eijnden, R.J.J.M., Lemmens, J.S., & Valkenburg, J.M. (2016). The Social Media Disorder Scale. *Computers in Human Behavior*, 61, 478


INDICATORI RIASSUNTIVI

Sono qui di seguito presentate le tavole riassuntive di alcune variabili di comportamento particolarmente significative per le condizioni di salute e benessere dei giovani, suddivise per età e stratificate per genere.

Undicenni che ...
(%)



Tredicenni che...
(%)



Quindicenni che...
(%)

