

OFF-LABEL 2014 approvati - aggiornati a Luglio 2014

Azienda Ospedaliera: ASL AL

Principio attivo	Nome commerciale	Forma Farmaceutica	Terapia consolidata	Uso off-label per singolo paziente	NOTE
			Indicazione	Indicazione	
6 mercaptopurina	Purinethol	cp		Malattia cronica intestinale in paziente intollerante a azatioprina	
Aripirazolo	Abilify	cp		Paziente di 15 anni affetta da anoressia nervosa	
Aripirazolo	Abilify	sosp		Paziente minore affetto da disturbo autistico. Sindrome di Charge	
Bortezomib	Velcade	fiala ev		LNH-B basso grado malignità follicolare	
Bortezomib	Velcade	fiala		Mieloma Multiplo in prima linea in paziente con grave insufficienza renale	
Bortezomib	Velcade	fiala		Linfoma mantellare plurirecidivato	
Bortezomib	Velcade	fiala	paziente con mieloma multiplo candidabile ad autotrapianto. Schema VTD		
Bosentan	Tracleer	cp		Paziente affetta da Fibrosi Cistica e ipertensione polmonare di classe NYHA 2-3 in valutazione per trapianto polmonare	Con le limitazioni riportate nel verbale
Cetuximab	Erbix	fiala		K colon avanzato	
Cetuximab	Erbix	fiala		K retto metastatico (fegato, polmone, linfonodi, osso)	
Ciclofosfamide	Endoxan	fiala	Paziente affetta da Sclerosi Multipla secondariamente progressiva		
Ciclosporina	Sandimmun Neoral	cp		Alopecia universale	
Ciclosporina	Sandimmun Neoral	cp		Pancolite ulcerosa in fase attiva refrattaria a steroidi	
Clonidina	Catapresan	cp/cerotti		Paziente pediatrico affetto da Sindrome di Tourette	
Colchicina	Colchicina	cp		Pericardite acuta e recidivante	
Colistina	Colimicina	fiale		Paziente affetto da IVU da Acinetobacter Baumannii multiresistente	
Colistina	Colimicina	fiale		Paziente affetto da polmonite multifocale da Acinetobacter Baumannii multiresistente	
Danazolo	Danatrol	cp		Aplasia midollare idiopatica	
Danazolo	Danatrol	cp		Piastrinopenia in mielofibrosi	
Daptomicina	Cubicin	fiala		Spondilodiscite C4- C6 da MRSA postintervento di laminectomia per ernia discale. Trattamento in associazione a linezolid	
Desametasone	Decadron 0,75 mg cp	cp		Trombocitopenia cronica autoimmune in paziente di 2 anni, resistente a terapia di prima linea	
Dipiridamolo	Persantin	cp	Test eco- dipiridamolo		
Enoxaparina	Clexane	fiala s.c.		Prevenzione recidiva ed estensione trombotici in paziente con elevato rischio di sanguinamento e trombotici vena porta	
Eparine a basso peso molecolare	vari	fiala s.c.	Sostituzione TAO in pazienti da sottoporre a interventi/ procedure invasive a rischio di sanguinamento.		
Eparina sodica	Eparina vister	fiala	Trattamento anticoagulante in dialisi		
Esomeprazolo	Esopral	cp		paziente pediatrico	
Fattore VIII e Von Willebrandt	Haemate P	fi		Paziente adulto in trattamento profilattico ad alte dosi	Con le limitazioni riportate nel verbale

Principio attivo	Nome commerciale	Forma Farmaceutica	Terapia consolidata	Uso off-label per singolo paziente	NOTE
			Indicazione	Indicazione	
Fentanil intranasale	Pecfent	spray		Dolore incoercibile in mesotelioma pleurico - dosaggio non in scheda tecnica	
Fentanil trans mucoso	Actiq	Pastiglia mucosale		importante sintomatologia algica e spasticità dovuta a lesione mielica incompleta post- traumatica	
Filgrastim	Granulokine	fiala		Neutropenia iatrogena da Ticlopidina	
Fluorochinoloni	Prodotti vari	cp	Trattamento di pazienti pediatrici immunocompromessi		
Fluorouracile	Fluorouracile	fiala	uso topico in oculistica per patologie corneali		
Infliximab	Remicade	fiala e.v.		Vasculite retinica refrattaria alle terapie convenzionali	
Infliximab	Remicade	fiala e.v.		Malattia di Bechet	
Ivabradina	Procoralan	cp		Tachicardia sinusale (tachicardia inappropriata in 3 pazienti affetti da uremia cronica in trattamento dialitico periodico, con ipotensione cronica e intolleranza a betabloccanti	con le limitazioni riportate nel verbale
Lidocaina fiale	Lidocaina fiala 2%	fiala	utilizzo topico anziché iniettivo per anestesia in corso di broncoscopia		
Lidocaina spray	Ecocain spray	spray	anestesia locale per mucosa orofaringea in corso di esami endoscopici		
Micofenolato mofetile	Cellcept 500 mg	cp		Glomerulonefrite secondaria a vasculite sistemica	
Mitomicina	Mytomycin C	fiala	uso topico in oculistica per patologie corneali		
Nadroparina	Seleparina	fiala s.c.		Profilassi di flebite e TVP in prolasso utero vaginale	
Nandrolone	Decadurabolin	fiala		Paziente maschio anziano cardiopatico con IRC IV stadio affetto da mielodisplasia e grave anemia	
Octreotide Lar	Longastatina Lar 10 mg	fiala		Angiodisplasia piccolo intestino. Posologia offlabel per sanguinamento residuo e anemia	
Olanzapina	Zyprexa	cp		Anoressia nervosa	
Olanzapina	Zyprexa	cp		Disturbo generalizzato di sviluppo con ritardo mentale in paziente < anni 18	
Olanzapina	Zyprexa	cp		Disturbo di personalità/ psicosi in paziente di 16 anni	
Quetiapina	Seroquel	cp	Trattamento psicosi in pazienti affetti da DA o demenza senile		
Pimozide	Orap	cp		Paziente pediatrico affetto da Sindrome di Tourette	
Rabeprazolo	Pariet	cp		Trattamento ad alti dosaggi in paziente affetto da K polmonare metastatico	
Risperidone	Risperdal gocce	gocce		Anomalie comportamentali in limite cognitivo lieve in paziente < 18 anni	
Risperidone	Risperdal cp	cp		Disturbo psicotico in paziente < anni 18 con paralisi cerebrale infantile e compromissione significativa del funzionamento generale.	

Principio attivo	Nome commerciale	Forma Farmaceutica	Terapia consolidata	Uso off-label per singolo paziente	NOTE
			Indicazione	Indicazione	
Risperidone	Risperdal	cp		Paziente pediatrico affetto da Sindrome di Tourette	
Risperidone	Risperdal	cp		Paziente < 18 anni con disturbi della condotta e comportamento dirompente	
Risperidone	Risperdal	cp		Paziente < 18 anni con disturbi della condotta e comportamento dirompente	
Risperidone	Risperdal	cp		Paziente < 18 anni con disturbi della condotta e comportamento dirompente	
Risperidone	Risperdal	gocce		Paziente pediatrico affetto da anomalie comportamentali in quadro di disturbo dello spettro autistico e deficit di attenzione	
Risperidone	Risperidone	gocce		Paziente pediatrico affetto da Sindrome di Tourette	
Risperidone	Risperidone	gocce		Paziente pediatrico affetto da disturbo del comportamento dirompente	
Risperidone	Risperidone	gocce		Paziente pediatrico affetto da disturbo del comportamento dirompente e deficit di attenzione con iperattività in ritardo cognitivo lieve. Terapia continuativa	Con le limitazioni riportate nel verbale
Rituximab	Mabthera	fiala		Porpora trombotica idiopatica	
Rituximab	Mabthera	fiala		Anemia emolitica autoimmune resistente a steroidi e immunoglobuline in talassemia major	
Rituximab	Mabthera	fiala		Granulomatosi di Wegner	
Rituximab	Mabthera	fiala		Crioglobulinemia mista	
Rituximab	Mabthera	fiala		paziente con Linfoma non Hodgkin leucemizzato	
Scopolamina	Transcop cerotti	cerotto transdermico	Scialorrea in paziente in stato comatoso		
Sildenafil	Revatio 20 mg	cp		Iperensione polmonare secondaria a embolie polmonari precapillari classe NYHA III non operabile	
Sumatriptan	Imigran fiale	fiale		Cefalea a grappolo resistente	
Tacrolimus	Prograf	cp		Sindrome nefrosica corticoreistente	
Tacrolimus	Prograf	cp		Trapianto allogenico in Linfoma di Hodgkin	
Talidomide	Talidomide Celgene	cp		Mieloma Multiplo in fase di mantenimento.	
Tamoxifene	Tamoxifene 10 mg	cp		Fibrosi retroperitoneale idiopatica in associazione a steroide. Malattia rara	
Temozolomide	Temodal	cp		Metastasi cerebrali da K polmone	
Tetrabenazina	Xenazina	cp		Discinesie orolinguali ingravescenti	
Tobramicina	Tobramicina	fiala	Uso per via aerosol in BPCO/ Bronchiectasia		
Tossina Botulinica	Botox	fiale	Acalasia		

Principio attivo	Nome commerciale	Forma Farmaceutica	Terapia consolidata	Uso off-label per singolo paziente	NOTE
			<i>Indicazione</i>	<i>Indicazione</i>	
Urochinasi	Urokinasi	fiale	Declothing cateteri venosi in dialisi		