 REGIONE PIEMONTE	<i>Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</i>		
	Codice: AL.RCRI.052.2014.00	Data emissione: 12/05/2014	Validità dal: 01/06/2014

In duplice copia per il paziente e per il medico di medicina generale

SCHEDA INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO CON BIFOSFONATI DA CONSEGNARE AL PAZIENTE AL MOMENTO DELLA PRESCRIZIONE

DEFINIZIONE E SCOPO DEL TRATTAMENTO

I bifosfonati sono farmaci che inibiscono il riassorbimento osseo .

Sono utilizzati in diverse patologie scheletriche al fine di prevenire ulteriori danni ossei e ridurre la sintomatologia dolorosa

Tutto questo si traduce per il paziente in un miglioramento della qualità di vita

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL TRATTAMENTO

I bifosfonati possono essere somministrati per via endovenosa, intramuscolare, orale .

Prima della somministrazione il paziente dovrà eseguire degli esami ematici di controllo che prevedono:

- Creatininemia basale (alla prima somministrazione di bifosfonato)
- Calcemia basale (alla prima somministrazione di bifosfonato)
- Albuminemia basale (alla prima somministrazione di bifosfonato)

Visita odontoiatrica preliminare con ortopantomografia delle arcate dentarie.

DECORSO DEL TRATTAMENTO

I bifosfonati sono generalmente ben tollerati dal paziente ma possono presentare i seguenti effetti collaterali: ipocalcemia, febbre e sintomi simil influenzali, malessere, brividi, fatica e vampate.


Sono possibili anche reazioni locali nella sede di infusione quale dolore, arrossamento, gonfiore, indurimento, flebiti.

Occasionalmente possono comparire dolori muscolari e nausea, raramente anoressia, dolori addominali, diarrea, stipsi, agitazione, confusione, sonnolenza, linfocitopenia, anemia, trombocitopenia, ipotensione, insufficienza renale, congiuntiviti, uveiti

I segni e i sintomi simil-influenzali (iperpiressia, leucocitosi, astenia, dolore muscolare e osseo), che si verificano generalmente dopo la prima somministrazione di BF per via endovenosa, si risolvono frequentemente entro 48 ore e rispondono al trattamento con farmaci anti-infiammatori non steroidei e trattamenti antipiretici

Struttura: SOC Rischio Clinico e Rischio Infettivo
FAX 0142 434810
Tel 0142 434612



		<i>Sede legale: Viale Giolitti, 2 15033 Casale Monferrato (AL) Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067</i>	
Codice: AL.RCRI.052.2014.00	Data emissione: 12/05/2014	Validità dal: 01/06/2014	Allegato: 1

Recentemente è stato identificato un altro effetto collaterale importante che si chiama **ostonecrosi dei mascellari**: è un evento raro che può capitare a seguito di procedure odontoiatriche, quali estrazioni dentali, uso di protesi incongrue, deficit anatomici (es tori mandibolari), malattia parodontale. E' estremamente importante effettuare, se possibile, una preliminare visita odontoiatrica e ricordare che, prima di sottoporsi a successive terapie dal dentista, è necessario segnalare l'uso di questi farmaci e concordare con il medico che ha prescritto il bifosfonato i tempi per eseguire tali procedure. In genere è necessario sospendere il farmaco per qualche mese prima e dopo una estrazione dentale.

Al momento della diagnosi di osteonecrosi è necessario far eseguire esami ematici di controllo che prevedono: Creatininemia Calcemia Albuminemia

Media delle ultime tre determinazioni di calcio sierico corretto per albumina prima della diagnosi di osteonecrosi

INDICAZIONI DI MASSIMA PER IL PAZIENTE

Il paziente dovrebbe smettere di fumare e assumere alcolici con moderazione, mantenere una scrupolosa igiene orale e mettere in atto tutte le misure di prevenzione possibili in accordo con il dentista di fiducia.

Il paziente ha richiesto le seguenti informazioni/spiegazioni aggiuntive sul trattamento sanitario proposto e/o sul contenuto della scheda : _____

Nome _____ Cognome _____

Data e luogo di nascita ___/___/___ a _____

Patologia di base _____

Terapia con bifosfonato _____

Data inizio terapia ___/___/___

Medico prescrittore _____

SOC _____

P.O. _____

Timbro e firma del medico

Firma del paziente

Struttura: SOC Rischio Clinico e Rischio Infettivo FAX 0142 434810 Tel 0142 434612	 una sanità in salute Fa bene a tutti
--	---